

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 16 AVRIL 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France - traitement CA03)

| Plaine (< 500 m)                    |      |      |                   | Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m) |      |      |                   |
|-------------------------------------|------|------|-------------------|---|------|------|-------------------|
| ANNEE                               | 2017 | 2016 | Moyenne 2009-2016 | ANNEE   | 2017 | 2016 | Moyenne 2009-2016 |
| LURCY-LÉVIS (225 m)                 | 675  | 533  | 520               | 500 m alt. (calculé)                          | 629  | 427  | 456               |
| MONTLUCON (231 m)                   | 714  | 551  | 536               | ÉCHASSIERES (650 m)                           | 609  | 390  | 434               |
| VICHY-CHARMEIL (249 m)              | 696  | 524  | 517               | 800 m alt. Mont. Bourb (calculé)              | 482  | 286  | 332               |
| MONTBEUGNY (270 m)                  | 690  | 511  | 520               | ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)                 | 426  | 216  | 286               |
| <i>Gain moyen depuis le 9 avril</i> | 80   | 80   | 70                | <i>Gain moyen depuis le 9 avril</i>           | 69   | 63   | 60                |

### REPÈRES ET CHIFFRES À CONNAÎTRE

#### Prairies « précoces » :

Composées de RGA sauvages, Dactyle, Fétuque élevée, Vulpin, présentent le stade épi 5 cm (fin déprimage) vers 500° Cj. Le stade épi 10 cm (fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage) vers 600° Cj. Le stade épiaison vers 750° Cj.

#### Prairies « tardives » :

Composées d'Agrostis, Pâturin commun, Fétuque rouge, présentent le stade démarrage de végétation vers 300° Cj. Le stade épi 5 cm (fin de déprimage) vers 800° Cj. Le stade épi 10 cm vers 900°Cj.

### CONSEILS DE LA SEMAINE : Début des fauches précoces

**En plaine**, le repère 700° Cj (stade début épiaison des prairies précoces) est atteint.

**Fauche** : Les ensilages et les enrubannages de ce type de prairie peuvent démarrer.

**Pâturage** : Si vous estimez que vous avez beaucoup d'herbe d'avance sur les parcelles de pâture, fauchez une partie soit en enrubannage soit en ensilage pour éviter le gaspillage.

**Pâturage tournant** : le premier tour de pâturage doit se finir. Ainsi, les épis ont été coupés sur l'ensemble des parcelles par les animaux. Les repousses seront donc feuillues et la valeur alimentaire de l'herbe restera élevée.

**Pour les altitudes entre 500 et 700 m**, préparez vous à récolter en ensilage ou enrubannage. Si vous avez un surplus très important d'herbe sur les parcelles de pâture, isolez une partie pour l'intégrer à vos fauches.

**Pour les altitudes supérieures à 700 m**, les 500° Cj seront atteints cette semaine : arrêtez le déprimage sur les parcelles de fauche.

### État actuel des exploitations suivies en 2017

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Deux-Chaises (450 m - BV - OV) | 1 <sup>er</sup> tour de pâturage pour BV et OV                 |
| Deux-Chaises (450 m - BV bio)  | Plein pâturage (1 <sup>er</sup> tour)<br>Premiers épis RG      |
| Limoise (270 m - BV)           | Plein pâturage (1 <sup>er</sup> tour)<br>PT de 2 ans non épié  |
| Le Breuil (350 m - BV)         | Plein pâturage<br>Premiers épis observés                       |
| Rocles (420 m - BL)            | Pâturage représente la moitié de la ration ; Enrubannage RG-TV |
| Lusigny (250 m - BV)           | Fin de 1 <sup>er</sup> tour<br>Début enrubannage               |