

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 23 AVRIL 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - données Météo France – traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	730	614	598	500 m alt. (calculé)	674	496	530
MONTLUCON (231 m)	765	630	617	ÉCHASSIERES (650 m)	657	456	509
VICHY-CHARMEIL (249 m)	745	607	598	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	513	342	392
MONTBEUGNY (270 m)	743	592	603	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	453	259	341
<i>Gain moyen depuis le 16 avril</i>	52	81	78	<i>Gain moyen depuis le 16 avril</i>	39	61	59

CONSEILS PÂTURAGE DE LA SEMAINE

Plaine : Pousse ralentie depuis 15 jours (surtout sur les parcelles précoces et fertiles). Gardez le même rythme de pâturage (2^e tour) mais pensez à des adaptations au cas où les précipitations seraient insuffisantes (affouragement ou augmentation de la surface).

Altitudes supérieures : on atteint les 700° Cj, le premier tour de pâturage doit se finir.

CONSEILS FAUCHE DE LA SEMAINE : 3 cas de figures observés

Prairies précoces 1^{ère} année : stade avancé avec une quantité observée assez importante : fauchez si ce n'est déjà fait. Couper au stade début épiaison permet de récolter au stade optimal (qualité/quantité). Si vous pensez ne pas avoir la quantité maximale, il est préférable de faucher maintenant pour préserver la qualité car la quantité n'augmentera plus. Après la fauche, une fertilisation est possible jusqu'à 30U d'azote (pour assurer les stocks et ne pas trop pénaliser les légumineuses) dès qu'un passage pluvieux sera annoncé. Cela favorisera une bonne repousse pour une deuxième récolte (pâturage ou fauche).

Prairies de type précoce retardée par une utilisation tardive : les prairies ayant été pâturées tard, et assez court (< 5 cm de hauteur) à l'automne ou l'hiver dernier montrent un retard considérable dans les hauteurs mesurées. Par conséquent, ces prairies seront plutôt destinées à des fauches intermédiaires. Cela retardera l'utilisation suivante. Pensez à organiser le pâturage et les fauches suivantes en conséquence. Si vous récoltez ces deux types de fourrages, identifiez et séparez les bottes (non destinées aux mêmes animaux).

Prairies à destination fauche tardive : Les hauteurs mesurées sont assez variables jusqu'à aujourd'hui, mais rien n'est joué pour le moment. Attention, pour les altitudes supérieures, le déprimage de ces parcelles doit se terminer.

Croissance décadaire de l'herbe

