

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 30 AVRIL 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France - traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	787	664	676	500 m alt. (calculé)	723	538	603
MONTLUÇON (231 m)	819	684	698	ÉCHASSIERES (650 m)	704	495	578
VICHY-CHARMEIL (249 m)	800	663	679	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	549	367	452
MONTBEUGNY (270 m)	798	641	683	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	485	269	394
<i>Gain moyen depuis le 23 avril</i>	55	53	87	<i>Gain moyen depuis le 23 avril</i>	43	31	67

### PRECIPITATIONS 2017 (tableau ci-dessous)

#### Précipitations moyennes de janvier à mars 1981-2010

Les précipitations des 3 premiers mois de l'année de 2017 sont supérieures à la moyenne des précipitations de 1981-2010, de 18 mm en moyenne sur les 4 stations.

#### Avril 2017

Le mois d'avril en revanche, est déficitaire. Sur ces 4 mois, les précipitations totales sont inférieures à la moyenne de 1981-2010.

## CONSEILS DE LA SEMAINE

### Récolte des ensilages et enrubannages dès que les conditions le permettent

Pour les fauches, respecter la **hauteur de coupe de 7-8 cm** pour ne pas ramasser de terre, permettre une repousse plus rapide et éviter l'épuisement du système racinaire de vos prairies. Pour les **ensilages**, viser un taux de **matière sèche de 30-32 %** (en tordant une poignée de fourrage, les mains s'humidifient légèrement mais pas d'écoulement de jus). Par beau temps, une journée complète sur andains conditionnés permet d'atteindre ce stade. L'herbe ensilée doit être hachée en **brins d'environ 7-8 cm** afin de faciliter le tassement de l'ensilage et ainsi de limiter l'air (régler l'ensileuse et affuter les couteaux). Au silo, éviter d'apporter de la terre et tasser par couche de 30 cm maximum. Fermer le silo le jour même. Pour l'**enrubannage**, le taux doit être de **50 % de MS** (le fourrage est souple mais devient mat comme du foin, pas d'humidité sur les doigts en tordant le fourrage). En plaine, dans 10 à 15 jours, on atteindra les 900°Cj (repère pour les fauches intermédiaires).

**Pâturage** : Les 25 à 40 mm de précipitations de la semaine dernière devraient être bénéfiques pour retrouver une bonne pousse (actuellement très faible). Continuez normalement. On consomme pour le moment notre herbe d'avance mais on devrait retrouver rapidement une meilleure situation.

### PRECIPITATIONS 1981-2010 / 2017 (mm)

	Vichy-Charmeil		Lurcy		Montbeugny		Montluçon	
	Moy 81-2010	2017	Moy 81-2010	2017	Moy 81-2010	2017	Moy 81-2010	2017
Janvier	46.8	44.8	50	35.4	49.2	41.8	45.5	36.4
Février	39.8	33.1	49.5	42.9	48.5	39.4	29.6	37.4
Mars	44.2	69.9	47.1	73.3	46.2	82.2	44.5	73.2
Avril	69.3	45.6	69.4	37.4	64.8	36.8	63.8	31.6
<b>Total</b>	<b>200.1</b>	<b>193.4</b>	<b>216</b>	<b>189</b>	<b>208.7</b>	<b>200.2</b>	<b>183.4</b>	<b>178.6</b>