

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 7 MAI 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France - traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	868	736	763	500 m alt. (calculé)	791	598	682
MONTLUCON (231 m)	900	751	787	ÉCHASSIERES (650 m)	768	559	655
VICHY-CHARMEIL (249 m)	881	733	767	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	602	412	518
MONTBEUGNY (270 m)	876	714	770	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	527	304	454
<i>Gain moyen depuis le 30 avril</i>	80	70	87	<i>Gain moyen depuis le 30 avril</i>	59	53	73

### BSV Prairie

Le BSV "Prairie" est une analyse à un instant donné et à l'échelle régionale de la situation des prairies face aux pullulations de **campagnols terrestres** et de **taupes**.

Vous pouvez le retrouver sur le site internet du FREDON Auvergne :  
<http://www.fredon-auvergne.fr/Suivi-2.html>  
<http://www.fredon-auvergne.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal.html>

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Récolte des ensilages et enrubbages si les conditions sont favorables

Réaliser des petits chantiers de récolte en enrubbage sur les terres portantes. 2-3 jours sans pluie sont annoncés. Les conditions devraient être plus favorables la semaine prochaine.

Pour les enrubbages, **faucher dès disparition de la rosée** pour ne pas piéger l'eau dans les andains et à une hauteur de **7-8 cm**. Faire des **andains larges** pour une meilleure exposition au soleil. La conditionneuse peut accélérer le séchage mais attention, plus la fauche est agressive (conditionneuse à doigts ou fléaux) plus les **pertes sont importantes en quantité et qualité** lors des interventions suivantes. Le **fanage** est à raisonner suivant le rendement et les conditions de séchage. S'il y a lieu, intervenir **le matin** sur un fourrage encore humide ou ré-humidifié pour limiter les pertes. Pour le pressage, obtenir une **balle dense et régulière**. Pour cela, confectionner un andain uniforme et de largeur proche de celle de la presse. Préférer le liage filet. La pose du film est très importante pour la conservation des bottes : mettre **4 couches** (graminées jeunes) à **8 couches** (luzerne). Rechercher un taux de matière sèche entre **50 et 60%** : en-dessous de 40%, cela entraîne de mauvaises qualités de conservation ; au-delà de 70%, les bottes peuvent être moins tassées et des moisissures apparaissent.

Pour le **pâturage**, la pousse de l'herbe est encore insuffisante. Si on récolte tôt, on pourra agrandir rapidement. Le nombre de jours d'avance continue de diminuer, un apport de fourrage est parfois nécessaire.

### État actuel des exploitations suivies en 2017

Deux-Chaises (450 m - BV - OV)	Milieu 2 <sup>ème</sup> tour de pâturage ovin Fin du 1 <sup>er</sup> tour de pâturage bovin
Deux-Chaises (450 m - BV bio)	Milieu du 2 <sup>ème</sup> tour de pâturage Pas de fauche pour le moment
Limoise (270 m - BV)	Milieu du 2 <sup>ème</sup> tour de pâturage Pas de fauche pour le moment
Le Breuil (350 m - BV)	Ensilage non réalisé Pousse plus faible que d'habitude
Rocles (420 m - BL)	Enrubbage non réalisé
Lusigny (250 m - BV)	Enrubbage en partie réalisé Milieu 2 <sup>ème</sup> tour de pâturage