

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 14 MAI 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France - traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	960	849	863	500 m alt. (calculé)	876	694	774
MONTLUCON (231 m)	993	855	887	ÉCHASSIERES (650 m)	850	653	745
VICHY-CHARMEIL (249 m)	974	843	869	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	673	494	599
MONTBEUGNY (270 m)	966	822	870	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	590	373	529
<i>Gain moyen depuis le 7 mai</i>	92	109	94	<i>Gain moyen depuis le 7 mai</i>	77	87	81

### REPÈRES ET CHIFFRES À CONNAÎTRE

#### Prairies « précoces »

Composées de RGA sauvages, Dactyle, Fétuque élevée, Vulpin, présentent le stade épiaison vers 750°Cj.

Le stade floraison vers 1100 °Cj.

#### Prairies « tardives »

Composées d' Agrostis, Pâturin commun, Fétuque rouge, présentent le stade épi 5 cm (fin de déprimage) vers 800° Cj.

Le stade épi 10 cm vers 900°Cj.

Le stade épiaison vers 1400 °Cj.

## CONSEILS DE LA SEMAINE

### Récolte des ensilages et enrubannages

Les conditions favorables de cette semaine permettent la **fauche des enrubannages et ensilages**. (Attention, cependant, certaines parcelles sont bien gorgées en eau). Aujourd'hui, récolter le plus tôt possible permet d'obtenir un fourrage de qualité (limitant ainsi la complémentation de la ration en énergie et en protéines). Le deuxième avantage est de pouvoir faire soit une deuxième coupe, soit agrandir plus rapidement la surface pâturée. Il faut compter entre 3 à 4 semaines avant d'intégrer ces parcelles dans le pâturage (soit autour du 10 juin).

Pour le **pâturage**, la pousse mesurée cette semaine est encore modeste. Cette croissance de 35 à 40 kg MS/ha/jour devrait se maintenir dans les semaines à venir. Ceci permet de nourrir entre 2 et 2,3 Equivalents Vache Veau (EVV) par ha et par jour. Si votre chargement est plus élevé, vous devez avoir suffisamment d'herbe sur pied pour combler la différence pour tenir un mois (avant l'ajout des parcelles de fauche). Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir soit de décharger le lot, soit agrandir la surface, soit apporter du fourrage.

Si vous avez des refus, prévoyez de les broyer juste après la sortie des animaux du pré pour avoir une repousse uniforme.

### Croissance décadaire de l'herbe

