

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 4 JUIN 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France – traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	1316	1134	1164	500 m alt. (calculé)	1218	948	1044
MONTLUCON (231 m)	1348	1148	1191	ÉCHASSIERES (650 m)	1190	899	1011
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1328	1132	1171	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	990	699	830
MONTBEUGNY (270 m)	1322	1102	1171	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	894	535	744
<i>Gain moyen depuis le 28 mai</i>	124	103	107	<i>Gain moyen depuis le 28 mai</i>	115	80	89

REPÈRES ET CHIFFRES À CONNAÎTRE

Prairies « précoces »

Composées de RGA sauvages, Dactyle, Fétuque élevée, Vulpin, présentent le stade floraison vers 1100 °Cj.

Prairies « tardives »

Composées d'Agrostis, Pâturin commun, Fétuque rouge, présentent le stade épi 10 cm vers 900°Cj.

Le stade épiaison vers 1400 °Cj.

Le stade floraison vers 1600 °Cj.

CONSEILS DE LA SEMAINE Réalisation des foins

Lancer ou continuer vos récoltes de foin. A 1400°C, l'ensemble des parcelles non étêtées devrait être fauché car, au-delà de cette limite, la valeur des fourrages est médiocre. Les parcelles fauchées fin avril ou étêtées par les animaux jusqu'à fin avril, peuvent être fauchées en deuxième coupe (enrubannage voire foin – les 500°Cj de cumul à partir du 23 avril sont dépassés). Sinon, elles peuvent être rajoutées à la surface de pâture.

Pour le **pâturage**, les mesures des hauteurs d'herbe de ces dernières semaines montrent une bonne reprise de la pousse. Attention à ne pas se faire dépasser par l'herbe. Visualiser les parcelles qui vont être pâturées prochainement : faire rentrer les animaux dès que la hauteur est atteinte même s'il reste de l'herbe à consommer sur la parcelle actuelle. Elle sera valorisée lors du prochain passage.

Sur le mois de juin, il est conseillé **d'éliminer mécaniquement** les plantes non consommées (chardons, rumex...). Le but est de réaliser une coupe franche, pas trop rase, à environ 7-8 cm de hauteur pour ne pas risquer de stopper la végétation. Les résidus doivent être le plus fin possible et répartis de façon homogène afin d'être rapidement assimilés par la prairie. Si les refus sont vraiment trop importants, il est possible de les faucher puis de les ramasser ou de les faire consommer par un lot d'animaux à faible besoin.

Croissance décadaire de l'herbe

