

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 18 JUIN 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - données Météo France - traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	1561	1369	1397	500 m alt. (calculé)	1457	1162	1268
MONTLUCON (231 m)	1593	1385	1429	ÉCHASSIERES (650 m)	1425	1108	1233
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1574	1370	1409	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1215	884	1034
MONTBEUGNY (270 m)	1565	1334	1407	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	1107	690	934
<i>Gain moyen depuis le 11 juin</i>	126	115	118	<i>Gain moyen depuis le 11 juin</i>	123	91	110

REPÈRES ET CHIFFRES À CONNAÎTRE

Durée de vie des feuilles :

Utile pour le pâturage après le deuxième tour

Pour le Ray-Grass, on perd une feuille (mort et apparition d'une nouvelle feuille) au bout de 500° C de cumul par rapport à la dernière utilisation. Il faut donc le faire pâturer au bout de 350° C.jr de repousse.

Espèces précoces (Dactyle, fétuque...) : Sénescence à partir de 800° C de cumul. Le pâturage peut avoir lieu après 500° C.jr de repousse.

Espèces tardives (fétuque rouge...) : Sénescence à partir de 860° C de cumul. Le pâturage peut avoir lieu après 500-550° C.jr de repousse.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Réalisation des foins et estimation des stocks

Finir les fauches de premières coupes et continuer les secondes coupes.

La pousse de l'herbe ralentit sur cette dernière décade : aux alentours de 30 kg MS/ha/jour. Garder de l'avance d'herbe sur pied pour le pâturage. Ne faucher pas trop de surface en 2^{ème} coupe avec le risque de redistribuer 10 jours après. Le coût serait bien plus élevé qu'un report d'herbe sur pied consommé par les animaux.

Il est temps également d'évaluer les stocks au stade actuel des chantiers de récolte. Comparer aux besoins futurs de vos animaux. Si nécessaire, mettre en place des dérobées pour limiter la consommation de fourrages jusqu'à l'hiver (dérobées pâturées), ou augmenter la quantité de vos stocks. Vous pouvez retrouver le **guide des dérobées sur le site de la Chambre d'agriculture** ou contactez nous.

Vous pouvez aussi mesurer les valeurs alimentaires de vos fourrages en faisant dès maintenant des analyses de fourrages. Cela permet d'évaluer le niveau alimentaire des concentrés que vous devrez acheter pour cet hiver (si besoin). La Chambre d'agriculture analyse vos fourrages toute l'année.

Croissance décadaire de l'herbe

