

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 25 MARS 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 450°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 300°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	271	309	11 avril	500 m alt. (calculé)	207	272	3 avril
MONTLUCON (231 m)	266	325	11 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	185	254	7 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	272	308	10 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	141	199	5 avril (200°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	247	308	13 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	101	153	9 avril (200°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 18 mars</i>	37	58		<i>Gain moyen depuis le 18 mars</i>	19	47	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fertilisation azotée

L'apport d'azote pour les **foins non déprimés** doit se faire autour des 350 - 450°Cj (base 1^{er} février)
Les 350 °Cj devraient être atteints début de semaine prochaine. Prévoyez vos **apports d'azote les 15 premiers jours d'avril**.

A plus de 800 m d'altitude : les 200°Cj base 1^{er} février devraient être atteints autour du 5 avril. Sur les prés prévus en ensilage ou enrubannage : vous avez encore 1 semaine pour apporter l'azote. Pour les prairies prévues en foin, les 350 °Cj devraient être atteints autour du 24 avril.

Les 300° Cj vont être atteints : la mise à l'herbe pourrait débuter cette semaine !

Si vos stocks de fourrages restants sont faibles, plus tôt les animaux seront au pré mieux ce sera.

→ Si les conditions de portance se sont améliorées la semaine dernière, et si les conditions météo le permettent (températures douces et pluies peu importantes), **les animaux peuvent être lâchés**.

Cependant, sur les prairies que nous suivons, il n'y a pas ou peu de stock d'herbe sur pied (< 5 cm) et la pousse de l'herbe est encore faible (inférieure à 20 kg MS / ha / jour).

→ Compte tenu de la pousse actuelle :

- soit **retarder la mise à l'herbe** pour laisser les prairies constituer du stock,
- soit **se tourner vers les parcelles de fauche** en réalisant un déprimage sur 1 à 2 semaines.

Mise à l'herbe : transition alimentaire & recommandations

3 semaines : adaptation de la flore ruminale

• **Sortie en journée** (après-midi = panse pleine) rentrée la nuit si parcs autour des bâtiments

• **Affouragement au pré** (ex : foin, paille)

→ « Apporter du sec »

• Vérifiez l'**accès à l'eau** de qualité en quantité suffisante

• Éviter les parcelles fertilisées

• Mettre des blocs de **sel** à disposition

• Pensez à la **gestion du parasitisme** de votre troupeau ! Si besoin, demandez conseil à votre vétérinaire pour adapter vos pratiques.

Pâturage tournant : hauteurs d'herbe

Il est conseillé de sortir les animaux précocement (250 °Cj ovin et bovin lait - 300 °Cj bovin viande) pour étaler au maximum la pousse de l'herbe au moment de son pic (fin avril – mai). Jusqu'au 15 avril, la pousse est insuffisante pour couvrir les besoins du lot mais au mois de mai, elle peut atteindre le double !

Hauteurs d'herbe pour la mise au pré

Entre **6 cm** (chargement faible ou ≈ 50 ares/UGB) et **8 cm** (chargement élevé ≈ 30 ares/UGB).