

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 29 AVRIL 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 900°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 700°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	716	678	12 mai	500 m alt. (calculé)	605	608	7 mai
MONTLUCON (231 m)	690	699	14 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	574	578	10 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	706	679	13 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	481	476	5 mai (500°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	681	683	15 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	424	395	8 mai (500°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 22 avril</i>	90	78		<i>Gain moyen depuis le 22 avril</i>	82	64	

FAUCHES PRÉCOCES : QUELQUES PRÉCONISATIONS

- ✓ Récoltez au stade **début épiaison** (700°Cj prairies précoces)
→ Meilleur compromis **qualité – quantité**.
- ✓ Ne fauchez pas trop bas : **6 – 7 cm** maximum.
- ✓ Visez un taux de MS de
 - **30 – 35 %** pour les **ensilages**,
 - **50 – 60 %** pour les **enrubannages**.

Repères : en tordant une poignée à la main
30 % MS : les doigts s'humidifient de quelques gouttes.
35 % MS : les doigts s'humidifient sans goutte.
40 % MS : pas d'humidité sur les doigts.
65 % MS : certaines feuilles sont cassantes.

CONSEILS DE LA SEMAINE

PÂTURAGE

Si les **hauteurs d'herbe** arrivent à « **mi – botte** » dans certaines pâtures :

→ « **débrayez** » **ces parcelles** en les récoltant en ensilage ou enrubannage. Cela permettra d'éviter le gaspillage et d'assurer au mieux des repousses de qualité pour le pâturage à venir.

→ si ces prés ne sont pas fauchables : **faites tourner** vos lots plus vite ou **augmentez le chargement temporairement** avec un autre lot par exemple.

Ne faites **pas pâturer en dessous de 6 – 7 cm** d'herbe (herbe « entre talon et cheville »).

LES 1^{ÈRES} FAUCHES PRÉCOCES ONT DÉBUTÉ

Les conditions météo de ces derniers jours ont été favorables à la pousse de l'herbe (≈ 90 kg MS / ha / j sur les prés que nous suivons) et ont fait évoluer rapidement les stades de développement.

→ **récoltez** les prairies où les principales graminées arrivent **début épiaison**, dès que 3 à 4 jours de beau temps sont annoncés,

→ vous disposez encore de **7 à 10 jours pour les prairies plus tardives**.

Dans tous les cas, pour ce type de récolte, en attendant plus, vous gagnerez peu en quantité mais perdrez beaucoup en qualité (chute des protéines).

Évolution des SOMMES DE TEMPÉRATURES de 2010 à 2018 à Lurcy-Lévis

