


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 06 MAI 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 900°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 900°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	800	762	12 mai	500 m alt. (calculé)	683	684	23 mai
MONTLUCON (231 m)	773	784	14 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	647	651	26 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	795	764	13 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	550	540	23 mai (700°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	768	767	15 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	486	451	27 mai (700°Cj)
Gain moyen depuis le 29 avril	86	84		Gain moyen depuis le 29 avril	72	69	

Exemple de suivi de MAT d'une prairie

Evolution de la MAT d'une prairie multi espèces destinée à être enrubbannée 2017



Stade de récolte et valeurs alimentaires

La valeur alimentaire des fourrages est très liée au stade de récolte. Plus les graminées avancent en stade, moins il y a de feuilles et plus leur valeur alimentaire se réduit. Pour récolter au stade optimum (compromis qualité/quantité), **viser le stade début épiaison (10% des épis visibles)**.

La diminution de MAT d'une prairie multi-espèces de l'Allier en 2017 le montre (voir graphique). Pour ce type de prairie, la chute est moins brutale que pour une prairie simple ou de Ray grass + trèfle.

CONSEILS DE LA SEMAINE

PÂTURAGE

Le premier tour de pâturage doit être fini depuis la semaine dernière (700° Cj le 28 avril). La pousse est toujours favorable même si elle ralentit par rapport à fin avril. **On retrouve des valeurs de pousse moyenne** (voir graphique ci-contre). Profitez du temps sec pour faire pâturer les zones habituellement humides.

RÉCOLTE DES ENSILAGES ET ENRUBANNAGES

Profitez de ces conditions pour **récolter les prairies précoces** avant les prochaines pluies. Dans tous les cas faites le tour de vos parcelles pour **observer l'apparition des épis** et déclencher la récolte (dépend des variétés semées pour les PT).

Une récolte précoce permettra de profiter d'une pousse encore favorable jusqu'à fin mai et de remettre plus rapidement ces parcelles dans le circuit de pâturage ou de viser une deuxième coupe.

Croissance décadaire de l'herbe

