

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 10 JUI 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 1400°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 1400°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	1369	1283	11 juin	500 m alt. (calculé)	1224	1164	20 juin
MONTLUCON (231 m)	1336	1308	13 juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1176	1120	23 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1369	1288	11 juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1040	968	18 juin (1100°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	1335	1287	13 juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	946	841	21 juin (1100°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 3 juin</i>	126	117		<i>Gain moyen depuis le 3 juin</i>	121	106	

FORMATION

Sécuriser son système fourrager avec des dérobées

Première journée le 28 juin à St Pourçain sur Sioule

Objectifs : Choisir la dérobée la plus appropriée à son exploitation, définir un itinéraire technique et l'utilisation qui en sera faite par les animaux.

à Travail de préparation en salle

à Prolongement par un suivi terrain (visites de parcelles)

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### PÂTURAGE

Les conditions sont toujours favorables à la pousse. Mais la croissance va tout de même ralentir. Il sera nécessaire **d'agrandir la surface pâturée** en intégrant les parcelles fauchées :

- Ceux qui ont pu récolter tôt peuvent déjà intégrer ces parcelles (réserver une partie aux 2<sup>èmes</sup> coupes),
- Ceux qui ont fauché plus récemment ou qui attendent de pouvoir récolter les foins n'auront pas de repousses disponibles avant 3-4 semaines. Si le stock d'herbe sur pied n'est pas suffisant d'ici là, vous pouvez :
  - **affourager** le lot d'animaux s'il reste des stocks de foin,
  - **réajuster** les lots,

- **réintégrer une partie d'une parcelle destinée à la fenaison**. Dans ce cas, il faudra avancer au fil et offrir une quantité d'herbe permettant de couvrir 1 à 2 jours de pâturage à chaque fois pour éviter le gaspillage. Cette solution évite le surpâturage des autres parcelles et minimise le coût.

#### FAUCHES

Comment gagner du temps de séchage ?

1. Utilisez une **conditionneuse** si vous en disposez (réduction du temps de séchage de 25 à 30%).
2. **Fanez rapidement après la fauche !**

### Cumul des pluviométries janv - juin

Les cumuls des pluviométries depuis le début de l'année sont 20 à 30 % supérieurs aux moyennes

