

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 1^{er} JUILLET 2018

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - données Météo France – traitement CA03)

Plaine (< 500 m)

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017
Gain moyen depuis le 24 juin	124	122	Gain moyen depuis le 24 juin	120	113
Gain moyen depuis le 17 juin	244	239	Gain moyen depuis le 17 juin	229	219
Gain moyen depuis le 10 juin	366	358	Gain moyen depuis le 10 juin	336	326
Gain moyen depuis le 3 juin	492	475	Gain moyen depuis le 3 juin	456	432
Gain moyen depuis le 27 mai	617	584	Gain moyen depuis le 27 mai	567	526

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fin des travaux de fenaison et réalisation des 2^{èmes} coupes

La pousse a fortement ralenti. Elle est passée aux alentours de 15 kg MS/ha/jour à cause des fortes chaleurs. Réalisez votre bilan de stock fourrager (herbe sur pied et fourrages conservés) et définissez votre stratégie pour cette fin d'année. Afin de limiter les besoins, faites un bilan au niveau des animaux et établissez les changements à venir : sevrage, réformes, ventes ...

Choix des dérobées

Le choix de la dérobée à implanter dépend de plusieurs facteurs : elle doit s'intégrer dans le système de rotation déjà en place (l'implantation de la culture suivante sera conditionnée par la date de récolte ou de pâture de la dérobée), elle doit correspondre à la valorisation souhaitée (fauche, pâture ou fauche et pâture).

L'utilisation de dérobée permet de sécuriser son système fourrager. Si le chargement sur l'été et/ou automne est important, la dérobée pâturée permettra de fournir un fourrage de qualité, plus économique qu'une récolte/distribution d'un autre fourrage. Si les stocks sont insuffisants, ou juste suffisants pour l'hiver, tournez vous vers une dérobée à récolter.

Demandez le guide des dérobées fourragères.

Pour le stock

Avant une céréale (prévoir minimum 75 jours de pousse pour la dérobée) :

- Sorgho fourrager, Millet fourrager, Moha + trèfle d'Alexandrie, Avoine brésilienne + légumineuse

Avant maïs :

- RGI + trèfle, « Méteil »

Pour la pâture

Avant une céréale (prévoir minimum 60 jours de pousse pour la dérobée) :

- Colza, Colza + RGI, Sorgho fourrager Sudan x Sudan, Millet fourrager, Moha + trèfle d'Alexandrie, Avoine brésilienne + légumineuse

Avant maïs :

- RGI + trèfle, Navet

Croissance décadaire de l'herbe

