

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 8 avril 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 500°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 450°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	428	448	14 avril	500 m alt. (calculé)	337	398	18 avril
MONTLUCON (231 m)	411	465	15 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	308	373	22 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	419	447	14 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	246	301	18 avril (300°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	394	448	17 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	193	239	23 avril (300°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 1^{er} avril</i>	90	71		<i>Gain moyen depuis le 1^{er} avril</i>	76	57	

FORMATION Diagnostic prairial et entretien des prairies

½ j en salle – ½ j visite exploitation

Jeudi 26 avril à Lapalisse

Objectifs : Caractériser ses prairies et adapter ses méthodes d'entretien, d'amélioration ou rénovation.

- Reconnaissance de bonnes ou mauvaises graminées et plantes bio indicatrices ...
- Techniques : pâturage, fauche, fertilisation, chaulage, interventions mécaniques...

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fertilisation azotée

L'apport d'azote pour les **foins non déprimés** doit se terminer (entre les 350 - 450° Cj base 1^{er} février). Pour les prairies au dessus de 500-600 m, les apports pourront débuter.

Mise à l'herbe et pâturage

La pousse est de plus en plus forte (cf graphique), pourtant les hauteurs mesurées et observées restent encore faibles par endroit. Attention, avec les conditions météorologiques, la pousse devrait s'accroître. A 400° j, les prairies plus tardives devraient elles aussi redémarrer.

→ Si la portance s'est améliorée, **sortir les animaux afin de ne pas se faire dépasser par l'herbe dans les jours à venir !**

Si la quantité d'herbe est insuffisante, mieux vaut sortir les animaux et affourager ou envisager le déprimage des parcelles de fauche (possible une semaine encore – jusqu'à 550° Cj).

Si vous notez la présence de plantes indésirables (rumex, chardons...), ne pas hésiter à lâcher les animaux tôt, et revenir souvent sur ces parcelles pour limiter leur développement.

Croissance décadaire de l'herbe

