

A vos Vignes

N° 1 – 17 avril 2018

Service Agronomie

Conseil collectif réalisé pour le département de l'Allier à partir des observations du
Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 1

A retenir :

Débourrement en cours
Quelques dégâts de mange-bourgeon
Peu d'excoriose

Mange-bourgeons

Le seuil d'intervention est de 15 % des ceps avec au moins un bourgeon touché.
Peu de parcelles l'atteignent.

Mildiou :

Les œufs ne sont pas encore mûrs, pas de risque de contamination.

Pas de traitement à prévoir

Oïdium:

Le premier traitement est à prévoir au stade 7-8 feuilles étalées.

Pas de traitement cette semaine

Un soufre peut être fait s'il y a eu une forte présence d'érinose ou d'excoriose l'année passée.

Service Agronomie

Conseil collectif réalisé pour le département de l'Allier à partir des observations du Bulletin de Santé du Végétal vigne n° 1

Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent

Vous trouverez ci-dessous différents liens:

- pour retrouver l'ensemble des matières actives des produits utilisables :

[e-phy catalogue produits phyto](#)

- l'état des lieux 2017 des résistances aux différentes molécules utilisées

http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_techique_commune_Vigne_2017_Vdef_cle8e7ec3.pdf