

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 9 JUI 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)



Réussir l'implantation
et la conduite de ses prairies
(1,5 jours)

25 juin (1 j) et 9 juillet (0,5 j) à Lapalisse
OU

26 juin (1 j) et 11 juillet (0,5 j) à Villefranche

- Choix des espèces et variétés.
- Maîtrise de la chaîne de récolte.
- Intégration de fourrages riches en légumineuses dans les rations.
- Partage d'expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1286	1274	15-juin	500 m alt. (calculé)	1183	1153	22-juin
MONTLUCON (231 m)	1288	1294	15-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1167	1109	23-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1291	1280	15-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	953	957	14-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1320	1275	13-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	878	838	14-juil.
<i>Gain moyen depuis le 2 juin</i>	108	118		<i>Gain moyen depuis le 2 juin</i>	99	107	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche

Dans la plupart des situations, les foins sont maintenant bons à être faits : stade **floraison** des principales graminées. Attendre plus ne fera que diminuer les valeurs en énergie et protéines pour peu de quantité en plus.


Pour les **prairies riches en légumineuses** (à base de trèfle ou de luzerne), les **2^{èmes} coupes** doivent être faites environ **6 semaines après la 1^{ère} coupe** pour un optimum quantité – qualité. Pour ceux d'entre vous qui avaient fait les 1^{ères} coupes fin avril – début mai : prévoir les 2^{èmes} coupes dès maintenant.

Pâturage

La **pousse** reste très **hétérogène** selon les secteurs. Continuer de faire tourner sur 4 à 5 parcelles minimum et agrandir avec les parcelles fauchées mi-mai (chargement à prévoir en été ≈ 70 – 80 a/EVV).

Profiter de la faucheuse attelée pour **faucher les refus un jour ensoleillé** (ne pas couper trop bas pour ne pas pénaliser les repousses). Laisser les animaux un jour de plus, car une fois secs, les refus pourront être ingérés.

PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI



Sur le mois de mai : 30 à 40 % de la pluviométrie moyenne.
Depuis le début de l'année : 50 à 60 % de la pluviométrie moyenne.