

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 16 JUI 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

FORMATION

Réussir l'implantation
et la conduite de ses prairies
(1,5 jours)

25 juin (1 j) et 9 juillet (0,5 j) à Lapalisse
OU

26 juin (1 j) et 11 juillet (0,5 j) à Villefranche

- Choix des espèces et variétés.
- Maîtrise de la chaîne de récolte.
- Intégration de fourrages riches en légumineuses dans les rations.
- Partage d'expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1391	1411	500 m alt. (calculé)	1278	1282	24-juin
MONTLUCON (231 m)	1395	1431	ÉCHASSIERES (650 m)	1259	1235	25-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1392	1417	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1034	1076	16-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1421	1410	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	954	947	16-juil.
Gain moyen depuis le 9 juin	89	120	Gain moyen depuis le 9 juin	76	107	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche

Dans la mesure du possible : **ne pas faucher trop bas** (6 – 7 cm), **faner le plus tôt possible** après la fauche pour étaler au maximum le fourrage sans perdre de feuilles et pour favoriser l'élimination de l'humidité du sol.

Comment préserver les feuilles ?

- ✓ Eviter de brasser un fourrage déjà sec.
- ✓ Privilégier les interventions tôt dans la journée, dès disparition de la rosée.

Comment gagner du temps de séchage ?


- ✓ Utiliser une conditionneuse si vous en disposez (réduction du temps de séchage de 25 à 30%).
- ✓ Faner rapidement après la fauche !

Attendre pour stocker les bottes et contrôler leur température afin d'éviter tout risque d'incendie. (IP n° 16)

Pâturage

La **pousse** est **hétérogène** selon les secteurs et les types de sol. Si vous constatez un manque d'herbe, préférer ouvrir une parcelle réservée au foin en avançant au fil plutôt que de récolter pour redistribuer ensuite.

CROISSANCE DECADAIRE DE L'HERBE



- La pousse avait fortement ralenti en moyenne ces dix derniers jours. Elle était toutefois hétérogène dans les exploitations suivies (15 à 35 kg MS/j).
- Elle devrait reprendre dans les jours à venir avec les pluies du week-end et les conditions annoncées.