


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 24 FEVRIER 2019

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 200°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 200°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	144	102	4 mars	500 m alt. (calculé)	146	88	6 mars
MONTLUCON (231 m)	155	112	3 mars	ÉCHASSIÈRES (650 m)	153	78	7 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	147	104	4 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	108	57	21 mars
MONTBEUGNY (270 m)	156	99	3 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	117	40	20 mars
Gain moyen depuis le 17 février	55	34		Gain moyen depuis le 17 février	52	23	

### Cumul des pluviométries depuis le début de l'année



### CONSEILS DE LA SEMAINE

Compte tenu des conditions météo, la portance est au rendez-vous et laisse la possibilité à certaines interventions « d'entretien » selon l'état de dégradation de vos prairies.

#### Prairies ou méteils semés à l'automne dernier

Pour les prairies ou méteils peu développés (< 8-10 cm), un passage de **rouleau** dès maintenant pourra **rappuyer** le sol et « favoriser » le **tallage**. (Vérifier que le passage de roues ne déracine pas les jeunes plantes).

#### Prairies permanentes ou de longues durées dégradées

Un passage de **rouleau** dès maintenant sur vos prairies permanentes pourra favoriser le **tallage** des graminées.

Envisager un passage d'**herse étrille** pour **niveler** le sol et / ou « **arracher** » la mousse et les indésirables qui se seraient développés suite à la sécheresse. Intervenir dès maintenant **en surface**, tant que l'herbe n'est pas repartie, **sans être trop agressif**.

Un **sur-semis**, pourra éventuellement permettre de **boucher les trous** de végétation : **10 – 15 kg / ha de RGI** au **semoir en ligne** ou **centrifuge** (début mars).

### SEMIS ET SUR-SEMIS

Même si les conditions sont actuellement favorables aux semis et sur-semis, il est encore **trop tôt pour semer** (trop de risque de gelée des jeunes graines) : prévoir vos semis et sur-semis de prairies et de méteils entre le **15-20 mars** et le **10-15 avril**.

En fonction des conditions météo à venir, il sera possible d'envisager un semis :

- de **RGI alternatif**,
- de **prairies sous couvert d'une céréale de printemps**,
- d'un **méteil de printemps**.

*Remarque : la réussite d'un sur-semis est très aléatoire.*