


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 3 MARS 2019

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	203	142	16 mars	500 m alt. (calculé)	210	119	16 mars
MONTLUCON (231 m)	220	154	14 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	219	107	17 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	208	144	16 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	159	77	15 mars (200°C.j)
MONTBEUGNY (270 m)	220	137	14 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	173	55	12 mars (200°C.j)
Gain moyen depuis le 24 février	63	40		Gain moyen depuis le 24 février	60	25	

### 2019 : une année précoce Evolution des sommes de températures (Montbeugny 270m)



### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Apport d'engrais sur prairies de fauche précoce

Les jours derniers ont permis, pour la plupart d'entre vous, d'épandre l'engrais. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, **il est grand temps de l'apporter pour les prés destinés à l'ensilage ou l'enrubannage.**

**A plus de 800 m d'altitude :** les 200° Cj base 1<sup>er</sup> janvier sont atteints (200° Cj base 1<sup>er</sup> fév autour du 12 mars). Les apports d'azote pour les prairies prévues en ensilage ou enrubannage **peuvent débuter.**

➤ Prochain repère : **350 - 450° Cj** base 1<sup>er</sup> février = apport d'**azote** sur les parcelles de foin.

#### Préparation du pâturage : la mise à l'herbe approche !

- Selon les conditions de portance, la mise à l'herbe pourra débuter :
- **Moutons** : quand les **250° Cj** seront atteints (prévision : autour du 9 mars).
  - **Vaches** : quand les **300° Cj** seront atteints (prévision : **8 à 10 jours plus tard** selon les conditions météo soit autour du 15 mars).

Avec de faibles stocks en cette fin d'hiver, lâcher les génisses plus tôt peut permettre d'économiser de la paille et des fourrages. Attention tout de même à la portance des sols ! Il sera nécessaire d'affourager au pré.

### Leviers pour reconstituer ses stocks

- **Organiser son système fourrager** afin d'augmenter la surface et la quantité à récolter sans pénaliser le pâturage
  - Organisation fauche/pâture
  - Gestion des effectifs
  - Fertilisation
  - Pâturage tournant
  - Fauches précoces et 2<sup>èmes</sup> coupes
- Semis de printemps (prairie, méteil, semis sous couvert, maïs ensilage)
- Sursemis
- Dérobées d'été
- Semis de prairies de courte durée