

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 17 MARS 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 500°Cj 1er fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 500°Cj 1er fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	335	241	3 avril	500 m alt. (calculé)	322	205	6 avril
MONTLUCON (231 m)	361	253	31 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	319	192	7 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	341	240	2 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	241	142	30 mars (300°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	354	236	1 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	234	110	29 mars (300°Cj)
Gain moyen depuis le 10 mars	64	54		Gain moyen depuis le 10 mars	43	43	



FORMATION

Première approche du pâturage tournant (1 journée)

28 mars à St Pourçain-sur-Sioule

- Connaître les grandes règles de fonctionnement du pâturage tournant
- Partage d'expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

Les 300° Cj sont atteints. **Il est temps de sortir les animaux.** Même si les quantités d'herbe et les conditions de pousse (< 20 kg MS/ha/jour) ne permettent pas de couvrir totalement les besoins en quantité des animaux, sortir maintenant permettra de gérer au mieux l'herbe dans les semaines à venir. Au besoin, **ajuster le chargement à 60 - 70 ares/UGB** lors de la mise à l'herbe, et **affourager** (mise à l'herbe progressive, déprimage...). Sortir les animaux si la hauteur d'herbe est suffisante (au moins 6 cm).

- Rappels :** Une **transition est recommandée** lors de changements alimentaires
- Sortir les animaux en journée après leur repas (panse pleine)
 - Affourager au pré pour « apporter du sec »
 - Mettre des pierres à sel à disposition
 - Vérifier l'accès à l'eau (qualité & quantité)

Apport d'engrais pour les foins

Repère : 350 - 450° Cj base 1^{er} février = apport d'azote sur les parcelles de foin.
Les apports d'engrais peuvent être réalisés sur les prairies destinées à être fauchées en foin dès cette semaine et ce durant une dizaine de jours.

Déprimage

Le déprimage de certaines parcelles pourra permettre de gagner des surfaces à pâturer. Attention toutefois à ne pas faire pâturer ces parcelles au-delà des 500-550° Cj au risque de pénaliser les rendements ! (cf dates prévues début avril - tableau). Passé ce stade, les animaux consomment l'épi (étêtage). Les repousses seront feuillues (bonne qualité alimentaire).

- si recherche de **stock** : **stopper le déprimage** des foins + apport d'azote (30-40 N),
- si recherche de **qualité** : **étêtage possible**. Attention, la quantité récoltée sera diminuée.