

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 24 MARS 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	387	296	4 avril	500 m alt. (calculé)	369	256	6 avril
MONTLUCON (231 m)	409	310	2 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	368	239	8 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	390	295	3 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	276	182	31 mars (300°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	409	293	2 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	268	143	30 mars (300°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 17 mars</i>	51	56		<i>Gain moyen depuis le 17 mars</i>	42	44	



STOP DEPRIMAGE DEBUT AVRIL

Prévoir la fin du déprimage début avril pour ne pas pénaliser les rendements (cf tableau 500°Cj).

Qui suis-je ?



Première des graminées à épier dans vos prairies permanentes : le **Vulpin**.

Pour me « limiter » :
- faucher les prés précocement,
- pâturer les prés en premier.

Vulpin épié
(21 Mars 2019)

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

Continuer les mises à l'herbe (hauteur d'herbe minimum 6 cm – chargement adapté si peu de pousse 60-70 a/UGB). Penser aux transitions alimentaires !

Semis - Sursemis de prairies ?

Même si les pluies se font attendre, les conditions de portance et températures semblent plutôt favorables à l'implantation de prairies pour ce printemps.

→ **Prévoir vos semis et sursemis entre le 15 - 20 mars et le 10 - 15 avril (« juste avant une pluie »).**

SEMIS

Envisager : un semis classique avec des RGI agressifs,
un semis de prairies sous couvert de céréales avec des mélanges de plus longue durée. La céréale doit protéger la prairie des « coups de chaud ». Elle pourra être récoltée immature ou moissonnée, et la prairie fauchable ou pâturable à l'automne.

- Préparer un lit de semence fin et émietté avec un outils à dents sans travailler trop en profondeur : pas de mottes de plus de 3 cm (favorise le contact sol / graines).
- Rouler avant semis avec un rouleau type cultipacker.
- Semer **60-70 kg/ha d'orge ou d'avoine de printemps**.
- Semer **la prairie à 25-30 kg/ha** avec votre semoir à céréales classique, socs relevés : les graines doivent être à moins de 1 cm de profondeur.
- Passer un coup de rouleau après semis pour rappuyer.

SURSEMIS

Le sursemis n'est possible que s'il y a des « trous » dans le couvert. Si besoin, agrandir les trous en arrachant la mousse et autres mauvaises herbes par un passage d'outils à dents.

- Préparer un lit de semence fin par un passage de herse.
- Semer **la prairie à 30 kg/ha (espèces agressives types Ray-grass, Trèfle)** avec votre semoir à céréales classique, socs relevés : les graines doivent être à moins de 1 cm de profondeur.
- Passer un coup de rouleau après sursemis ou faire passer un lot de bêtes (80-90 a/UGB) pour rappuyer.

Remarque : les conditions de réussite d'un sursemis sont très aléatoires.

Prairie dégradée

