n° 7

26 mai 2020

Viticulture Auvergne

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture

À retenir cette semaine

Floraison en cours
Risque mildiou et black-rot en diminution, quelques taches de black-rot
Risque oïdium maintenu, d'intensité variable selon l'historique parcellaire
Premiers glomérules observés, peu nombreux
Emergence des larves de cicadelles vertes et de flavescence dorée

BSV réalisé à partir des observations parcellaires des 2 vignobles suivis dans le cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations. Cette année, le réseau comprend 22 parcelles observées par 14 observateurs sur 5 cépages différents.

Données du réseau

17 parcelles renseignées, 14 dans le vignoble de Saint Pourçain, 3 dans le vignoble des Côtes d'Auvergne.

Stades phénologiques

La floraison est en cours sur toutes les parcelles. Elle se déroule dans de bonnes conditions climatiques, toutefois un peu moins vite qu'attendu. En effet, les parcelles les plus précoces ne sont qu'à peine à la mi-floraison.

Inflorescence à divers degrés de floraison

Situation sanitaire

Tordeuse de la grappe

Le premier vol s'achève et les premiers glomérules sont désormais observés. Ils sont rares, et observés seulement sur 3 parcelles, avec un maximum de 8 pour 100 grappes. Les très faibles dégâts occasionnés seront facilement compensés et n'auront pas de conséquences sur la récolte. En effet, les grains voisins grossiront plus pour compenser.

Glomérule intact à gauche et glomérule « ouvert » à droite, avec à l'intérieur la larve d'eudémis qui l'a formé

Cicadelle verte

On observe les toutes premières larves. Elles sont très petites et plus difficilement visibles. On en dénombre encore très peu, quelques unités pour 100 feuilles.

Cicadelle de la flavescence dorée

Les toutes premières larves viennent d'émerger. On rappelle que ces larves naissent indemnes du phytoplasme de la flavescence, et qu'elles sont donc sans danger tant qu'elles ne se nourrissent pas sur un cep déjà contaminé. Aucun cep malade n'a été détecté dans l'Allier, et le foyer découvert dans le Puy-de dôme semble sous contrôle.

Mildiou

Toujours pas de taches observées. S'il y avait eu des contaminations, on les aurait maintenant vues. La pluie de samedi dernier n'a pas dû provoquer de contaminations, ou seulement très localement. Le temps chaud et sec des prochains jours éloigne le risque de contamination.

Black rot

On observe cette semaine une petite sortie de taches. Elles restent rares. La période est critique pour la contamination des grappes, mais le temps chaud et sec devrait empêcher qu'elle ait lieu.

Situation sanitaire

Black rot (suite)

Les taches de black-rot se reconnaissent avec certitude lorsque l'on observe des Petits points, les pycnides. Il s'agit de la fructification du champignon.
La tache est entourée d'un liseré plus foncé.

Oïdium



Il n'y a pas de nouvelle parcelle avec symptôme d'oïdium.
Le temps chaud et relativement humide est très favorable à l'oïdium. Les taches pourraient être plus visibles. La floraison est une période de forte sensibilité aux maladies et à l'oïdium en particulier. Le risque d'avoir des dégâts sévères décroit ensuite.

C'est le bon moment pour aller observer vos parcelles ! Il est très important de connaître la fréquence de foyer primaire sur sa parcelle pour agir en conséquence.



Taches anciennes, maintenant visibles en face supérieure

symptômes « âgés », sortis depuis au moins 3 semaines

symptômes récents, d'une semaine environ

Vu au vignoble

Criquet isolé profitant d'un bain de soleil

Les méligèthes (petits coléoptères) sont toujours nombreux au moment de la floraison. Ils se nourrissent de pollen, mais sont sans danger pour la vigne

Devinette

Que peut-on voir sur cette feuille :

- un développement anarchique de poils
- du mildiou
- de l'oïdium
- de l'érinose ?

Réponse la semaine prochaine!

Et réponse à la devinette de la semaine dernière

La photo ci-contre représente-elle un symptôme:

- d'excoriose
- de froid
- de frottements
- de black-rot ?

Il s'agissait tout simplement des séquelles de frottement de la feuille. Le fil présent sur la photo dans le coin en haut à gauche était un indice.

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : François ROUDILLON - froudillon@allier.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : Véronique SARROT - vsarrot@allier.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint-Pourçain, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint-Pourcinois et des Côtes d'Auvergne.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité .