n° 10

16 juin 2020

Viticulture Auvergne

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture

À retenir cette semaine

Stade grain de plomb-petits pois
Mildiou : pas de tache observée
Oïdium : symptômes détectés sur 1 nouvelle parcelle de chardonnay
black-rot : peu ou pas de progression
Larves de cicadelles en légère augmentation

BSV réalisé à partir des observations parcellaires des 2 vignobles suivis dans le cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations. Cette année, le réseau comprend 22 parcelles observées par 14 observateurs sur 5 cépages différents.

Données du réseau

15 parcelles renseignées,13 dans le vignoble de Saint Pourçain, 2 dans le vignoble des Côtes d'Auvergne.

Stades phénologiques

Le stade majoritaire se situe entre les stades « grain de plomb » et « petits pois ». Ce même stade n'était atteint l'année dernière que le 2 juillet. Ce millésime est donc, pour l'instant, plus précoce de 2 semaines environ. Il y avait 3 semaines d'écart à la floraison.
L'épisode de grêle du 8 juin dans le secteur de Besson (03) a laissé des marques sur les baies exposées. Espérons que les pertes soient compensées

Stade grain de plomb-petit pois

Variabilité de stade au sein d'un même cep. Ici dû au gel

Raisins ayant subit des impacts de grêle

Situation sanitaire

Tordeuse de la grappe

Le second vol n'a pas encore commencé. Le temps pluvieux de ces derniers jours a dû le perturber.

Cicadelle verte

Les larves de cicadelles vertes sont présentes maintenant sur quasi toutes les parcelles. Leur nombre est encore très limité et largement en dessous du seuil de nuisibilité. Pour rappel, le seuil de nuisibilité est de 100 pour 100 feuilles.

Larves de cicadelles vertes de différents stades et couleurs

Cicadelle de la flavescence dorée

Les larves de cicadelles de la flavescence dorée restent très peu nombreuses dans nos vignobles. Elles n'ont été observées cette semaine que sur 3 parcelles, secteur de Louchy dans l'Allier et de Lachaux dans le Puy de Dôme.

Mildiou

Il n'y a toujours pas de tache observée, même sur témoins non traités et parcelles abandonnées. Les pluies de ces derniers jours ont pu entraîner des contaminations mais les temps d'incubations sont plus longs du fait des températures relativement faibles. Il y a peu de pluie prévue pour les prochains jours, et il semblerait que l'on retrouve un temps chaud et sec d'ici 10 jours. Le risque de contamination est donc faible, et on se rapproche du stade de faible sensibilité des grappes.

Black rot

Il y a pas d'apparition de nouveau symptôme. Mais les durées d'incubation sont longues, des symptômes pourraient n'être visibles que dans quelques jours. La sensibilité des baies commence à décroitre.

Situation sanitaire

Oïdium

L'oïdium continue sa progression. Il a été détecté sur une nouvelle parcelle de chardonnay cette semaine. Toutes les parcelles sur lesquelles il est observé ne sont pas touchées avec la même intensité. Sur quelques parcelles où il a été détecté tôt, le champignon progresse lentement : peu de ceps contaminés, et peu de feuilles avec taches. Sur d'autres parcelles, où la détection a été souvent plus tardive, une majorité de cep est contaminé, avec des taches plus nombreuses.

Il est vivement recommandé de surveiller ses parcelles, pour connaître le niveau de contamination. La fréquence de cep touché est une information primordiale pour pouvoir adapter les moyens de lutte en conséquence.

L'effeuillage est par exemple une très bonne méthode pour limiter la progression du champignon. Effectué à ce stade, la baie s'habitue progressivement au soleil, et est moins susceptible d'être « grillée » en cas d'épisode de forte chaleur cet été.

Premières taches observées début mai : elles ont peu progressé.

Tache récente



Symptômes observés sur une nouvelle parcelle : ils sont très étalés sur toute la feuille.

Vu au vignoble

Cicatrice ressemblant à de l'excoriose

Ponte de chrysope. La larve est un auxiliaire, dévorant de nombreuses larves et acariens.

Chenille préparant sa mue

Petit insecte vu assez fréquemment.

Une coccinelle ovale !

Devinette

Toutes ces photos (prises sur plusieurs années), représentent soit un symptôme d'oïdium soit de mildiou. Sauriez-vous les distinguer ?

Réponse la semaine prochaine

Réponse à la devinette de la semaine dernière :



Il y avait 2 taches

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
http://viticulture.ecophytopic.fr/viticulture

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : François ROUDILLON - froudillon@allier.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : Véronique SARROT - vsarrot@allier.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint-Pourçain, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint-Pourcinois et des Côtes d'Auvergne.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité .