


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 10 mai 2020

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 1100°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1049	841	13 mai	500 m alt. (calculé)	973	747	21 mai
MONTLUCON (231 m)	1069	859	11 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	941	723	23 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1059	845	12 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	793	599	10 juin
MONTBEUGNY (270 m)	1078	845	11 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	736	515	11 juin
<i>Gain moyen depuis le 3 mai</i>	117	99		<i>Gain moyen depuis le 3 mai</i>	109	86	

PLUVIOMÉTRIE AVRIL 2020



Sur le mois d'avril, un déficit de 40 à 60 % est constaté. Néanmoins, les pluies tombées en mai permettent de « rattraper » ce déficit mais elles restent hétérogènes : 25 à 70 mm sur les 6 stations.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : La pousse d'herbe atteint 60 à 85 kg MS/j/ha.

Si plus de 25 jours d'avance et que la hauteur d'herbe > 15 cm : **faucher maintenant la parcelle.**

Si moins de 25 jours d'avance, **bloquer les animaux sur un paddock et affourager**, faire pâturer plus bas (pas en dessous de 5 cm). Il est également possible de gagner quelques jours avec un pâturage de méteils après fauche.

Les parcelles fauchées mi avril devraient pouvoir être intégrées au pâturage.

Si présence de refus, faucher une journée avant de sortir les animaux afin qu'ils les consomment.

Fauche

Si des parcelles prévues en ensilage/enrubannage n'ont pas été récoltées avant le stade fin épiaison, attendre et récolter en foin (rapport qualité/prix).

Compte tenu des températures, les stades évoluent rapidement. Le stade floraison devrait être atteint au 15 mai en plaine (1100° Cj) : **prévoir les foins**. Passé ce stade, attendre vous fera perdre en qualité et gagner peu de quantité.

QUELLES ALTERNATIVES APRÈS UN MÉTEIL ?

Besoin de stocks ?

➤ Fort potentiel de rendement

- **Sorgho fourrager** (7-8 tMS), semis avant le 10/07 + possibilité de pâture (si hauteur > 70 cm), ≈ 0,85 UF
- **Maïs précoce** (8-10 tMS), semis avant le 20/06, ≈ 0,90 à 0,95 UF

➤ Potentiel modéré et forte appétence

- **Moha-moha/trèfle** : récolte ou pâture, semis avant le 10/07, ≈ 0,7 à 0,85 UF / 12-15 % MAT

Besoin de surface à pâturer ?

- **Colza fourrager** : transition nécessaire + paille à disposition