

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 7 juin 2020

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1464	1259	500 m alt. (calculé)	1361	1135	/
MONTLUCON (231 m)	1475	1277	ÉCHASSIERES (650 m)	1326	1099	/
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1476	1264	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1135	948	30 juin
MONTBEUGNY (270 m)	1500	1262	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	1058	828	1 ^{er} juillet
<i>Gain moyen depuis le 31 mai</i>	113	118	<i>Gain moyen depuis le 31 mai</i>	100	105	

FORMATION

REUSSIR L'IMPLANTATION ET LA CONDUITE DE PRAIRIES RICHES EN LEGUMINEUSES


1 jour

17 juin à Moulins

- Choix des espèces et variétés
- Maîtrise de la chaîne de récolte
- Intégration de fourrages riches en légumineuses dans les rations
- Echanges et partages d'expérience

Pour plus de détails et vous inscrire, contactez le **04.70.48.42.42**

PLUVIOMÉTRIE DU MOIS DE MAI



Mis à part dans les secteurs de Montbeugny et St Nicolas (25% d'eau en moins), **les précipitations de Mai sont dans la moyenne** de celles des 10 dernières années.

Avec en moyenne 180 à 230 mm depuis le début de l'année, **le déficit reste marqué : 15 à 35 % en moins par rapport aux précipitations des 10 dernières années.**

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche : attention au stockage

Les conditions ont permis de faire des foins le week-end de Pentecôte et les jours suivants mais ils restent encore « verts » car pas « murs » sur pied ou ont pu « prendre l'eau ». Surveiller les particulièrement.

4 à 5 jours après avoir bottelé : vérifier la température des bottes de foin.

Si avec une sonde, la température est < 45 °C : le stockage est possible.

Si en laissant une tige en acier ou en cuivre 1 h au centre de la botte, elle est trop chaude pour être tenue quand elle est retirée : attendre pour stocker ou « mettre à l'abris » en continuant de surveiller.

Dérobées : optimiser la réussite d'implantation

- sol fin et émietté par passage d'outil superficiel à dent.
- semis : **possible au semoir à céréales classiques pour le Sorgho** (12,5 cm d'écartement ou plus), à la volée ou en ligne pour Moha, Avoine, Colza, Trèfle d'Alexandrie.
- profondeur de semis : 1 cm pour Moha, Trèfle, Colza, 2 – 3 cm pour mélanges à base d'Avoine, 3 – 4 cm pour Sorghos.
- roulage après semis avec un rouleau packer.