


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 14 juin 2020

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1556	1376	500 m alt. (calculé)	1455	1249	
MONTLUCON (231 m)	1580	1395	ÉCHASSIERES (650 m)	1416	1208	
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1579	1382	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1215	1053	1-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1605	1379	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	1129	922	2-juil.
Gain moyen depuis le 7 juin	101	119	Gain moyen depuis le 7 juin	85	107	

CROISSANCE DÉCADEIRE DE L'HERBE



- La pousse avait ralenti en moyenne ces dix derniers jours.
- Elle devrait reprendre dans les jours à venir avec les pluies du week-end et les conditions annoncées.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche

La qualité a fortement diminué pendant ces 15 derniers jours. Continuer les foins dès qu'une fenêtre météo (« même courte ») se présente.

Si certaines parcelles ont versé, faucher légèrement plus bas (risque de pénaliser les repousses). Attention à ne pas remonter de la terre dans le fourrage, surtout en conditions plus humides.

Légumineuses : Prévoir les secondes coupes des prairies fauchées début mai.

Rappel : pour favoriser la pérennité (3 - 4 ans) des luzernes et des trèfles : laisser une coupe fleurir.

Pâturage : la pousse reste hétérogène (15 à 45 kg MS/j/ha)

En fonction des conditions de pousse : Passer de 40-50 a/UGB à 60-70 a/UGB.

Prévoir d'atteindre 80-90 a/UGB dans les semaines à venir.

Les parcelles ayant été fauchées la dernière semaine de mai peuvent être intégrées progressivement au pâturage suivant les conditions locales de pousse.

Profiter de la faucheuse attelée pour faucher (à ≈ 8cm) les refus (une fois secs, les animaux les consomment).

Broyer les chardons juste avant floraison (de préférence avant une pluie)

QUI SUIS-JE ?

- Plante bisannuelle ou vivace
- Principalement dans les prairies sèches ou saines - peut traduire une conduite extensive
- Tiges rigides généralement refusées par les animaux (sauf en périodes très sèches)
- **Toxique en vert et en fourrage** lors d'ingestions répétées
- ⚠ Risque plus élevé en ensilage (pas de tri possible par les animaux)



Je suis le **SÉNEÇON DE JACOBÉ (OU JACOBÉE)**

→ En pleine floraison actuellement, **détruire cette plante** si vous la voyez dans vos prairies !