

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU <u>8 mars 2020</u>							
(Cumul à partir du 1 <sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)							
Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2020	Prévision date 500°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2020	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	299	186	31 mars	500 m alt. (calculé)	267	147	12 mars
MONTLUCON (231 m)	320	200	29 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	252	148	15 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	305	188	31 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	193	97	29 mars
MONTBEUGNY (270 m)	305	183	30 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	159	83	3 avril
<i>Gain moyen depuis le 1<sup>er</sup> mars</i>	49	44		<i>Gain moyen depuis le 1<sup>er</sup> mars</i>	31	32	

Exploitations suivies en 2020 dans le réseau pousse d'herbe	
Deux-Chaises (450 m) BV – OV	Pâturage tournant pour BV et OV : Début de mise à l'herbe au moins pour les lots de génisses cette semaine
St Didier en Donjon (290 m) BV	Pâturage tournant pour tous les lots : Mise à l'herbe progressive prévue autour du 15 mars pour les vaches ; lots de génisses 1 an et 2 ans réformes lâchés
Lusigny (250 m) BV	Pâturage tournant pour les vaches suitées : Mise à l'herbe prévue autour du 15 mars

### CONSEILS DE LA SEMAINE


#### 300 ° Cj atteints : Débuter la mise à l'herbe en plaine

Si les conditions le permettent (portance des sols, météo..), les premiers lots peuvent être lâchés (génisses, réformes...). L'objectif n'est pas de sortir tout le lot mais de charger progressivement.

Quel que soit le nombre de parcelles, mettre à l'herbe dès à présent permettra de **consommer l'épi** et donc de **terminer le 1<sup>er</sup> tour de pâturage** avant l'épiaison (autour des 700 – 750 ° Cj) afin de limiter le gaspillage et valoriser des repousses de qualité.

S'il y a moins de 5 cm d'herbe sur pieds (notamment sur les prairies dégradées par la sécheresse), **retarder la mise à l'herbe** de quelques jours ou **adapter le chargement (voir IP n° 4)**.

Le déprimage de certaines parcelles pourrait aussi permettre de gagner des surfaces à pâturer.

 Pour le déprimage, ne pas faire pâturer au-delà des 500 ° Cj (prévision fin mars en plaine) pour ne pas couper l'épi au risque de pénaliser les rendements !

#### Prochain repère : Apport d'engrais sur les parcelles de foin (350 – 450 ° Cj)

Prévoir les apports d'engrais dès la semaine prochaine sur les prairies destinées à être fauchées en foin.

### Mise à l'herbe : transition alimentaire & recommandations

3 semaines : adaptation de la flore ruminale

- **Sortie en journée** (après-midi = panse pleine), rentrée la nuit si parcs autour des bâtiments
- **Affourager au pré** (ex : foin, paille) → « Apporter du sec »
- Vérifier l'**accès à l'eau** de qualité en quantité suffisante
- Eviter les parcelles fertilisées
- Mettre des blocs de **sel** à disposition
- Penser à la **gestion** du **parasitisme** de votre troupeau ! Si besoin, demander conseil à votre vétérinaire pour adapter vos pratiques.