


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 05 avril 2020

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 750°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 750°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>536</b>	430	20-avr.	500 m alt. (calculé)	<b>473</b>	366	26-avr.
MONTLUCON (231 m)	<b>544</b>	445	19-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>451</b>	358	30-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>528</b>	430	20-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>351</b>	269	18-mai
MONTBEUGNY (270 m)	<b>545</b>	430	18-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>314</b>	230	22-mai
Gain moyen depuis le 29 mars	<b>45</b>	71		Gain moyen depuis le 29 mars	<b>35</b>	57	




Les sommes de températures augmentent précocement et les stades de végétation avancent rapidement : il faut **anticiper les récoltes précoces**.

Quelle que soit la zone du département, 2020 est sur la même tendance que 2017 (voire même plus précoce).

### OBJECTIFS 700 - 750 °CJ ?

**Pâturage tournant = fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage**  
→ couper l'épi dans la gaine

- ✓ « favoriser » des repousses feuillues en 2<sup>ème</sup> cycle de pâturage,
- ✓ éviter les refus (car les animaux « laissent » les graminées épiées).



**Fauches précoces = optimum qualité/quantité** (surtout pour RGI et RGH précoces)

**Ne pas attendre plus !** Passé ce stade :

- la quantité augmente peu mais la teneur en protéine diminue rapidement (**-1 à -1,5 point de MAT/semaine**),
- risque de ne plus avoir de «fenêtre météo» favorable.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Pâturage

Ces derniers jours, la pousse de l'herbe a été très réduite en raison des gelées matinales et des faibles précipitations. En moyenne, **elle atteint au maximum 20 kg MS / j / ha** dans les prairies pâturées que nous suivons.

**1 UGB consomme 17 kg MS / jour**

→ Avec la pousse actuelle et sans stocks d'avance sur pied, il faudrait compter environ 80a/UGB.

En pâturage tournant avec peu de stock d'herbe d'avance : affourager si nécessaire et continuer le premier tour de pâturage. S'il est terminé, possibilité de « parquer » et affourager ou d'ajouter une parcelle (ex : parcelle prévue à la fauche) dans le cycle de pâturage.

#### ➤ Prochain repère : 700-750° Cj = début épiaison

Compte tenu des températures depuis le 1<sup>er</sup> février, le top des « 700 - 750 ° Cj = début épiaison » pourrait être atteint d'ici **2 semaines en plaine** et **3 semaines à plus de 500 m** (cf graphique ci-contre et tableau ci-dessus).

→ Prévoir **les fauches précoces et finir le 1<sup>er</sup> tour de pâturage**.