


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 7 mars 2021

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>258</b>	181	12 mars	500 m alt. (calculé)	<b>250</b>	133	13 mars
MONTLUCON (231 m)	<b>259</b>	194	12 mars	ÉCHASSIÈRES (650 m)	<b>242</b>	144	16 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>273</b>	183	11 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>203</b>	79	27 mars
MONTBEUGNY (270 m)	<b>266</b>	178	11 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>199</b>	82	27 mars
Gain moyen depuis le 28 février	<b>49</b>	42		Gain moyen depuis le 28 février	<b>44</b>	28	

### CUMUL DE LA PLUVIOMETRIE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE



→ Depuis le début de l'année : Pluviométrie « équivalente » aux 10 dernières années (sauf Saint Nicolas)

### COMMENCER LE LÂCHER ?

**Quand ?**

- **Ovin – BL** = à partir des **250°Cj** base 1<sup>er</sup> fév,
- **BV** = à partir des **300°Cj** base 1<sup>er</sup> fév.

**Pourquoi ?**

Pour terminer le **1<sup>er</sup> tour de pâturage avant épiaison** (donc couper l'épi dans la gaine) et avoir le plus de repousses feuillues par la suite

**Quelles catégories ?**

- Laitonnes et génisses,
- Réformes destinées à être finies à l'herbe (+ complément)

*Remarque : la sortie des vaches suitées est possible en fonction de la date de mise en repro, des échographies....)*

Prévoir une transition alimentaire sur 2 à 3 semaines.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Mise à l'herbe : débuter progressivement

Les sommes de températures atteignent en moyenne les 260°Cj depuis le 1<sup>er</sup> février (cf *Tableau ci-dessus*)  
Selon les conditions, même si la pousse de l'herbe **reste hétérogène** selon les parcelles et les secteurs du département : **4-5 cm** pour les parcelles peinant à redémarrer (exposition, surpâturage d'automne,...) à **6-8 cm** pour d'autres plus avancées, la mise à l'herbe **progressive** peut commencer pour constituer petit à petit les lots (cf *Encadré ci contre*).

Prévoir un chargement de l'ordre de **70 à 80 ares/UGB** pour charger **progressivement** dans les semaines qui viennent.

#### 2 alternatives :

- lâcher sur les prés qui seront pâturés au printemps pour débuter le 1<sup>er</sup> tour de pâturage.
- faire pâturer des prés destinés à la fauche : déprimage (dans ce cas, pour ne pas risquer de pénaliser les rendements, stopper le déprimage avant le stade épi 5 cm = 500-550 °Cj, prévus autour du 3 avril).

#### Fertilisation

Les apports sur fauches précoces **doivent maintenant se terminer**.  
Concernant les prairies destinées à être fauchées en foin, les apports d'azote devraient pouvoir débuter dans une dizaine de jours (atteinte des 350°Cj 1<sup>er</sup> fév).