

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 27 mars 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 450°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 450°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	413	356	30-mars	500 m alt. (calculé)	362	272	4-avr.
MONTLUCON (231 m)	394	368	1-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	360	293	6-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	396	357	31-mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	267	155	23-avr.
MONTBEUGNY (270 m)	425	356	29-mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	246	187	25-avr.
<i>Gain moyen depuis le 20 mars</i>	70	57		<i>Gain moyen depuis le 20 mars</i>	66	44	

MESURER AVEC LA BOTTE ?

- ✓ **Herbe au talon** = 5 cm à l'herbomètre



Sortir impérativement les animaux

- ✓ **Herbe à la cheville** = 8 cm à l'herbomètre



Possible de faire pâturer

- ✓ **Herbe à mi-botte** = 12 cm à l'herbomètre



Faire pâturer dès que possible

PÂTURAGE TOURNANT COMMENT L'ORGANISER ?

- Chargement : 30-50 a/UGB
Chargement instantané : 8-10 a/UGB
- Nombre de parcelles : minimum 5 (prévoir un paddock mécanisable pour une éventuelle fauche si pousse importante ou possibilité de faire pâturer un autre lot)
- Temps de séjour : 3 à 5 jours
- Temps de repousse minimum : 21 jours
- Fin du 1^{er} tour : 650-700°Cj

Remarque : Veiller à l'accès à l'eau et à l'ombre dans toutes les parcelles.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Compte tenu des cours des engrais, carburants et concentrés : cette année, la gestion fine de la fertilisation et du pâturage est d'autant plus importante.

Fertilisation : feu vert pour les foins

Les apports d'engrais sur les prairies destinées à être fauchées en foin, doivent être réalisés cette semaine (cf tableau ci-dessus). Profiter des pluies annoncées (attention au froid).

Si les reports de stocks sont suffisants (> à 1/3 des besoins) : sans être totale, envisager une impasse sur certains prés (par exemple non pâturés après fauche, vieilles prairies, ...). Privilégier les jeunes prés et ceux prévus au pâturage et apporter au minimum 30 u N/ha et 50 u N/ha maximum.

Repère : 350 - 450°Cj base 1^{er} février = apport d'azote sur les parcelles de foin.

Pâturage

Sur les prairies suivies (cf IP 4), les hauteurs d'herbes sont très hétérogènes (de 0,5 à 1 cm/semaine) pour des croissances de 15 à 25 kg MS/ha/j. Même si les températures et les faibles précipitations ne sont pas encore des plus favorables : lâcher dès maintenant quelques bêtes permettra de gérer ce « timide » démarrage tout en chargeant progressivement dans les semaines à venir.

Une organisation en pâturage tournant (découpage de la surface de base en plusieurs parcelles) permettra de mieux gérer l'herbe au printemps et d'éviter un éventuel gaspillage au pic de pousse (cf encadré ci-contre). Cette organisation contribue également à limiter les quantités de concentrés tout en maintenant les performances et peut éventuellement permettre de dégager de la surface à faucher en supplément.