

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 24 avril 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	697	665	/	500 m alt. (calculé)	616	558	3 mai
MONTLUCON (231 m)	676	675	26-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	606	571	4 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	678	665	26-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	476	346	22 mai
MONTBEUGNY (270 m)	715	671	/	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	440	399	25 mai
<i>Gain moyen depuis le 17 avril</i>	73	85		<i>Gain moyen depuis le 17 avril</i>	64	72	

CALCUL DES JOURS D'AVANCE

- ✓ **Mesurer les hauteurs d'herbe** (cf IP N°7) ex : **9 cm**
- ✓ **Estimer la hauteur d'herbe disponible** (pour une hauteur de sortie prévue à 5 cm) **9 – 5 = 4 cm**
- ✓ **Convertir la hauteur d'herbe disponible en quantité de matière sèche** (1 cm = 200 kg MS/ha)
4 cm x 200 kg MS/ha = 800 kg MS/ha
Si parcelle de 2 ha,
800 kg MS / ha x 2 ha = 1600 kg MS
- ✓ **Calculer les besoins journaliers du lot** (20V de 750 kg vifs + 20v de 150 kg vifs + 1T = 22,6 EVV)
22,6 EVV x 17 kg MS/EVV/j = 384 kg MS/j
- ✓ **Calculer les jours d'avance**
1600 kg MS / 384 kg MS/j = 4,2 jours
- ✓ **Faire le calcul pour toutes les parcelles disponibles pour le lot et additionner**

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse d'herbe entre 40 et 80 kg MS/ha/j

La gestion de l'herbe devient un enjeu en raison de l'accélération de la pousse (pic de croissance, risque de gaspillage...).

Estimer les jours d'avance (cf. encadré calcul des jours d'avance) permet d'ajuster le pâturage.

Avec la pousse actuelle, l'avance doit être de plus de 20 jours : continuer l'organisation (chargement 40-50 a/UGB). Si toute fois, l'avance est inférieure à 20 jours, affourager et maintenir un chargement supérieur à 50 a/UGB.

Rappel : dans tous les cas, ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm (cf. encadré ci-contre), pour ne pas pénaliser la repousse.

Si présence de refus (ex : vulpin épié) : les faucher une journée avant la sortie des animaux pour les faire consommer.

Fauche

Avec les conditions économiques actuelles, récolter un fourrage précoce de qualité permet de rentabiliser au mieux les intrants (engrais, plastique d'enrubannage...). Ce fourrage de qualité permettra de limiter l'achat de correcteur azoté l'hiver prochain. De plus, une récolte précoce permettra d'appréhender l'organisation du pâturage sur la période estivale (implantation d'une culture de printemps, diminution du chargement, fauche de 2^{ème} coupe...).

Prochain stade : 750° Cj : début épiaison → fauches précoces

Préparer les fauches pour saisir la prochaine fenêtre météo !

LES DIFFÉRENTS COUPS DE DENTS SUR LA PLANTE

