

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 1<sup>er</sup> mai 2022

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 900°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>777</b>	738	10-mai	500 m alt. (calculé)	<b>696</b>	626	1-mai
MONTLUCON (231 m)	<b>760</b>	749	12-mai	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>684</b>	632	3-mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>763</b>	741	11-mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>544</b>	388	22-mai
MONTBEUGNY (270 m)	<b>800</b>	744	9-mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>506</b>	442	23-mai
<i>Gain moyen depuis le 24 Avril</i>	<b>71</b>	76		<i>Gain moyen depuis le 24 Avril</i>	<b>65</b>	61	

### PROFITER DE LA PRÉSENCE DE TRÈFLE ...



TV - RG en 2<sup>ème</sup> année  
avec fort développement de Trèfle cette année

- ✓ Si légumineuses en « **boutons** » (on sent les boutons sous les doigts) : faucher dans les 10 jours, sinon attendre
- ✓ Faucher à **7 - 8 cm** maximum : facilite le séchage, les repousses, évite la présence de terre

### FAUCHES PRÉCOCES : QUELQUES PRÉCONISATIONS

- ✓ Récolter au stade **début épiaison** (700°Cj prairies précoces)  
→ Meilleur compromis **qualité - quantité**.
- ✓ Ne faucher pas trop bas : **6 - 7 cm** maximum.
- ✓ Viser un taux de MS de :
  - **30 - 35 %** pour les **ensilages**,
  - **50 - 60 %** pour les **enrubannages**.

Repères : en tordant une poignée à

**30 % MS** : les doigts s'humidifient de quelques gouttes.

**35 % MS** : les doigts s'humidifient sans goutte.

**40 % MS** : pas d'humidité sur les doigts.

**65 % MS** : certaines feuilles sont cassantes.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

Le **pic de pousse** arrive (≈ 45 - 70 kg MS/ha/j) : attention de ne pas se laisser surprendre pour éviter le gaspillage.

#### Pâturage

Si l'**herbe arrive** à « **mi botte** » dans certaines pâtures (≈ 12 cm) :

→ « **débrayer** » **ces parcelles** en les récoltant en ensilage ou enrubannage : permettra d'éviter le gaspillage et d'assurer au mieux des repousses de qualité pour le pâturage à venir.

→ si ces prés ne sont pas fauchables : - **faire** tourner les lots **plus vite** ou faire passer un **autre lot**.  
- **augmenter le chargement temporairement** (entre 35 et 45 a/UGB)

Rappel : *Idéalement, sortir les animaux des paddocks entre **5 - 7 cm** d'herbe (« entre talon et cheville »).*

#### Feu vert sur les fauches précoces



Les stades de développement évoluent rapidement avec les montées en températures : gain moyen la semaine passée = 70 ° C (cf tableau)

→ **récolter** dès que possible les prairies où les principales graminées arrivent **début épiaison**,

→ les prairies plus tardives peuvent attendre **7 à 10 jours de plus**.

Passé le stade début épiaison : attention à la baisse de MAT sans gain de quantité.