


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 10 avril 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	519	493	26 avril	500 m alt. (calculé)	452	404	14 avril
MONTLUCON (231 m)	506	504	27 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	445	415	15 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	508	496	26 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	336	241	4 mai
MONTBEUGNY (270 m)	536	496	24 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	301	279	6 mai
<i>Gain moyen depuis le 3 avril</i>	60	75		<i>Gain moyen depuis le 3 avril</i>	40	61	


CROISSANCE DÉCADAIRE DE L'HERBE (KG MS/HA/J)



- ✓ Sur les parcelles suivies : même tendance que moyenne 2008–2021 → « **pic de pousse** » approche.
- ✓ Gel et épisode neigeux → « **ralentissement** » de la pousse sans grande conséquence.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage




La pousse reste « modérée » : **10 à 25 kg MS/ha/j** (cf graphique ci-contre), mais les conditions météo semblent « plus propices », continuer la mise à l'herbe progressive pour faire le 1^{er} tour de pâturage dès maintenant.

Cela permettra de **consommer l'épi** dans la gaine et donc de favoriser des **repousses feuillues** pour la suite de la campagne.

Les animaux lâchés depuis une quinzaine de jours ont consommé les vulpins. En revanche sur les autres prés, ils sont maintenant épiés (refus au pâturage).

Pour les prairies pâturées avant fauche (cf encadré ci-contre) :

- Si reports de stocks limités (< 1/3 des besoins) : ne pas risquer de pénaliser les rendements.
=>  retirer les animaux dès maintenant.
- Si reports de stocks suffisants (> 1/3 des besoins) : possibilité d'envisager de privilégier la qualité des récoltes par rapport à la quantité.
=> laisser les animaux plus longtemps sur ces prés.

Remarque : ne pas faire pâturer plus de 30 % des surfaces prévues à la fauche, chargement ≈ 1 UGB/ha.

Fertilisation ?

Apporter 30 à 50 U d' N/ha après déprimage. Un apport sur le reste des surfaces est maintenant trop tardif.

DÉPRIMAGE OU ÉTÉTAGE ?

Faire passer un lot d'animaux avant fauche, oui, mais tout dépend ce que l'on recherche ?

- **De la qualité sans pénaliser les quantités ?**
Ne pas faire consommer l'épi dans la gaine = sortir les animaux avant le stade « épi 5 cm » (= 500°Cj base 1^{er} février).

⇒ c'est le **DEPRIMAGE**.

- **Privilégier la qualité au dépend de la quantité ?**

L'épi est consommé dans la gaine : les repousses sont « feuillues », de qualité mais les rendements diminuent.

⇒ c'est l'**ÉTÉTAGE**.

Remarque : au pâturage, on cherche à faire consommer un maximum d'épis dans la gaine pour éviter les refus (montée à épis) et avoir des repousses au maximum feuillues.