


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 13 mars 2022

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>271</b>	247	16 mars	500 m alt. (calculé)	<b>233</b>	169	21 mars
MONTLUCON (231 m)	<b>266</b>	260	17 mars	ÉCHASSIÈRES (650 m)	<b>230</b>	201	22mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>259</b>	250	17 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>158</b>	96	6 avril
MONTBEUGNY (270 m)	<b>280</b>	246	15 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>137</b>	125	8 avril
<i>Gain moyen depuis le 6 mars</i>	<b>46</b>	50		<i>Gain moyen depuis le 6 mars</i>	<b>37</b>	38	

### PLUVIOMÉTRIE DE JANVIER À AUJOURD'HUI (mm)



Déficit de **43 à 54 %** des précipitations sur ce début d'année (janvier → 13 mars) par rapport à la moyenne 2011-2021.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

Malgré une année précédente idéale, les stigmates des sécheresses sont encore visibles et peuvent continuer à pénaliser la production des prairies.

#### Entretien et optimiser mes prairies

Vu le contexte d'augmentation des prix des carburants, veiller à ce que les conditions optimales soient réunies pour la réussite des semis ou opter pour des conduites de travail simplifié (sursemis).

Prioriser les prairies à rénover et faire des choix (30 à 40% des surfaces initialement prévues).

Les **semis/sursemis de printemps** sont préconisés entre le **15-20 mars et mi avril** pour limiter les pertes dues aux gelées tardives.

→ **sursemis ?** Regarnir les trous de végétations sans détruire le couvert en place. Le résultat est aléatoire suivant les conditions climatiques.

→ **rouleau ?** Sur prairies et méteils implantés à l'automne, peu développés, en conditions saines de portance, afin de favoriser le tallage.

#### Anticiper votre mise à l'herbe

Les 300° Cj (base 1<sup>er</sup> janvier devraient être atteints cette semaine. Si les conditions météo se maintiennent, sans gelées, il est possible de lâcher des petits lots d'animaux dès à présent (jeunesses) à un chargement de 60 a/UGB par exemple.

**Rappel :** 250° Cj pour les ovins et 300 ° Cj pour les bovins.

### RÉUSSIR SON SEMIS DE PRINTEMPS

- 30 à 32 kg/ha en semis et +/- 25 kg/ha en sursemis.
- Profondeur : 0,5 cm à superficiel.
- Rouler de préférence avant et après le semis pour améliorer la surface de contact (éviter motte et poche d'air).
- Semer sous couvert d'une orge ou avoine de printemps (60 à 80 kg/ha).
- Si intervention « pansement », choisir des espèces à croissance rapide (RGI ou RGH).
- Semis au centrifuge, semoir en ligne, semoir anti-limaces.

*Remarque : Privilégier des espèces agressives avec des risques de perte moins élevés.*

*A savoir : Une semaine supérieure à 38°C : destruction des ray grass.*