

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 20 mars 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 450°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 450°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	339	309	1 ^{er} avril	500 m alt. (calculé)	294	227	7 avril
MONTLUCON (231 m)	333	322	1 ^{er} avril	ÉCHASSIERES (650 m)	289	254	8 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	326	312	2 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	207	130	25 avril
MONTBEUGNY (270 m)	350	309	31 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	182	161	29 avril
<i>Gain moyen depuis le 13 mars</i>	62	57		<i>Gain moyen depuis le 13 mars</i>	50	47	



JE CONNAIS ET J'ENTRETIENS
MES PRAIRIES :
DIAGNOSTIC PRAIRIAL ET
PLANTES BIO-INDICATRICES

5 avril 2022

A Saint-Pourçain-sur-Sioule

- Evaluation du niveau de dégradation des prairies et reconnaissance des plantes bio-indicatrices
- Choix des techniques d'entretien, d'amélioration et de rénovation des prairies
- Réalisation d'un diagnostic prairial

Pour plus de détails et vous inscrire,
contactez le **04.70.48.42.42**

MISE À L'HERBE : TRANSITION ALIMENTAIRE & RECOMMANDATIONS

3 semaines = adaptation de la flore ruminale

- **Sortie en journée** (après-midi = panse pleine), rentrée la nuit si parcs autour des bâtiments
- **Affourager au pré** (ex : foin, paille)
→ « Apporter du sec »
- Vérifier l'**accès à l'eau** de qualité en quantité suffisante
- Eviter les parcelles fertilisées
- Mettre des blocs de **sel** à disposition
- Penser à la **gestion** du **parasitisme** de votre troupeau ! Si besoin, demander conseil à votre vétérinaire pour adapter vos pratiques.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe: 300° Cj atteints dans une majorité du département

Si les conditions le permettent (météo, portance des sols...), la mise à l'herbe peut débuter (génisses, réformes...). L'objectif n'est pas de sortir tout le lot mais de **charger progressivement**.

Si hauteur d'herbe < 5 cm et/ou mauvaises conditions de portance : retarder la mise à l'herbe de quelques jours ou adapter le chargement :

- **Prairies tardives** qui n'ont pas encore redémarré et hauteur d'herbe < 5 cm : **70-80 ares/UGB** puis charger progressivement dans les semaines qui viennent.

- **Prairies précoces et productives** et hauteur d'herbe > 7 cm : **50-60 ares/UGB**

Dans tous les cas, il faudra réaliser une **transition alimentaire** lors de la mise à l'herbe (cf. encadré).

Remarque : quel que soit le nombre de parcelles, mettre à l'herbe dès maintenant permettra de terminer le 1^{er} tour de pâturage avant épiaison pour éviter le gaspillage et avoir des repousses de qualité.

Fertilisation

Les apports sur fauches précoces **doivent maintenant se terminer**.

Prochain repère : **450°Cj** → fertilisation des parcelles prévues en foin.

Ce stade devrait être atteint autour du 1^{er} avril 2022 en plaine.