

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 3 avril 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	462	424	6-avr.	500 m alt. (calculé)	404	337	12-avr.
MONTLUCON (231 m)	446	435	7-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	401	355	13-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	446	424	7-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	301	197	1-mai
MONTBEUGNY (270 m)	477	425	5-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	277	234	3-mai
Gain moyen depuis le 27 mars	51	70		Gain moyen depuis le 27 mars	38	57	

PÂTURAGE TOURNANT SUIVI À BRESSOLLES



▪ 23 vaches suitées (Charolaises) avec veaux mâles (vêlages d'automne)

▪ Chargement : 37 ares/ UGB en pâturage tournant sur 13 parcelles avec rotation tous les 2 j

➔ Mise à l'herbe le 30/03. Depuis le 25/03, sortie en journée, rentrée en bâtiment le soir pour assurer une transition alimentaire.

Fertilisation : sur l'ensemble de l'exploitation uniquement fumure organique.

CLÔTURES :

« QUELQUES PRÉCONISATIONS »

- Fil lisse ou barbelé
 - ⚠ interdiction d'électrifier des barbelés
 - avec fil lisse : plus de souplesse d'adaptation et de mobilité,
 - avec fil barbelé: solidité accrue et pas de suivie électrique à réaliser.
- Poste de clôture :
 - éloigné des réseaux électriques aériens d'au moins 15 m,
 - le plus près possible du départ de la clôture,
 - prise de terre : 3 tiges métalliques de 1 m enfoncées tous les 3 m,
 - installé à au moins 10 m de la terre du circuit 230 V des bâtiments.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

La pousse est hétérogène selon les parcelles et les secteurs du département (pâturage hivernal, altitude...). La baisse des températures et les épisodes neigeux de la semaine dernière ont ralenti la pousse de l'herbe : actuellement comprise entre 5 et 18 kg MS/ha/j. Continuer de lâcher les animaux en adaptant le chargement :

- Sur les prairies déjà précoces et productives, charger à 40 a/UGB,
- Sur les prairies plus tardives, charger à 45-50 a/UGB,
- Pour les prairies les plus pénalisées, charger à 60 a/UGB.

Cette année, le trèfle semble beaucoup plus présent (conséquence positive de l'accès à la lumière des sécheresses précédentes ?). Pour éviter les déséquilibres alimentaires et compte tenu des changements de températures brutaux et de l'humidité : mettre un fourrage fibreux à disposition (foin grossier/paille) et découper les parcelles si possible. Pour ces surfaces prévues à la fauche : réserver les pour des fauches précoces afin de préserver au maximum les légumineuses.



Pour les parcelles déprimées, prévoir de stopper le pâturage avant les 500° Cj (prévision cette fin de semaine en plaine et milieu de semaine prochaine en altitude, cf tableau ci-dessus).

Implantation printanière

Les semis et sursemis de printemps doivent être réalisés au plus vite : avant le 10-15 avril pour favoriser un bon enracinement avant l'arrivée des fortes chaleurs estivales.