

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 6 mars 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)


Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 300°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 300°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	224	190	16 mars	500 m alt. (calculé)	191	127	20 mars
MONTLUCON (231 m)	226	201	16 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	187	154	22 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	212	194	18 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	127	68	5 avril
MONTBEUGNY (270 m)	231	189	15 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	109	95	9 avril
<i>Gain moyen depuis le 27 février</i>	44	41		<i>Gain moyen depuis le 27 février</i>	35	27	

SUIVIS DE PRAIRIES : DÉBUT DES OBSERVATIONS

Cet hiver, les prés ont davantage « jauni » et la végétation semble avoir connu un « repos » un peu plus marqué que les années précédentes. Depuis quelques jours et selon les zones, les prairies reverdisent avec présence de nouvelles pousses, marquant le redémarrage.

Nos suivis, observations et mesures débutent dès maintenant

- Chaque semaine :
 - Observation des stades de développement des principales graminées
 - Observation de plantes bio – indicatrices
 - Mesures des hauteurs d'herbe
 - Croissance hebdomadaire de l'herbe
- 4 exploitations « supports » :
 - Prairies fauchées (fauches précoces et foins)
 - Prairies pâturées



CONSEILS DE LA SEMAINE

Entretien de prairies ?

Si présence de trous de végétation, sol nu, mousse, sol à niveler,..., un **entretien** est envisageable dès maintenant sur sols portants, avant le « plein redémarrage » des prairies (dans les 7 à 10 jours qui viennent).

Quelle que soit l'intervention, veiller à ne pas être trop agressif :

- Si **jeunes prairies** ou **méteils**, implantés à l'automne, peu développés (herbe « au talon ») : un passage de rouleau cranté peut favoriser le tallage, casser les mottes,
- Pour **éliminer la mousse**, **niveler le sol** : un passage d'outils à dents peut être envisagé. Dans ce cas, il faudra nécessairement prévoir un semis pour combler les trous. Le sursemis reste une alternative très aléatoire fortement dépendante des conditions d'implantation et de la météo.
- Sur les prés pour lesquels les hauteurs d'herbe arrivent « **à la cheville** », ou avec de jeunes repousses d'adventices (rumex,...) : possibilité de faire passer, rapidement, un lot de laitones ou de femelles prévues à la finition :
 - 1 UGB / ha pendant 1 semaine,
 - laisser 1 botte de fourrage sec (privilégier de la paille), de l'eau et du sel à disposition,
 - si pluies annoncées : sortir les animaux.



Herser systématiquement les prés uniquement pour aérer ne présente aucun effet positif sur le rendement et peut même pénaliser la production d'herbe jusqu'à - 30 % (agressivité pour les racines et les jeunes pousses).