


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 8 mai 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	870	816	9 mai	500 m alt. (calculé)	781	697	18 mai
MONTLUCON (231 m)	851	827	10 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	767	702	18 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	853	820	10 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	618	440	6 juin
MONTBEUGNY (270 m)	897	822	8 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	579	497	6 juin
<i>Gain moyen depuis le 1^{er} Mai</i>	93	90		<i>Gain moyen depuis le 1^{er} Mai</i>	80	75	

ÉVOLUTION DE LA MAT D'UNE PRAIRIE MULTI-ESPÈCES DU DÉPARTEMENT



→ baisse de la MAT avec l'évolution des sommes de températures

→ entre 800 et 900°Cj (base 1^{er} février) : perte de MAT sans gain de rendement : fourrages moins riches en protéines

QUI SUIS-JE ?



Je me distingue par ma couleur vert clair. Je suis amer et, comme le sainfoin et le lotier, riche en tannin : ce qui fait de moi un bon antiparasitaire contre les strongles digestives.

Je résiste bien à la sécheresse estivale mais ma croissance rapide au printemps nécessite une gestion stricte du pâturage car je suis mal consommé si trop développé. Je suis riche en protéine, en eau et je me conserve mal dans les fourrages.

Me semer en mélange à 1 ou 2 kg/ha maximum.

Je suis la Chicorée

CONSEILS DE LA SEMAINE

Suivant les zones du département, la pousse reste hétérogène (types de sols, faibles précipitations, conduite des prairies : fertilisation, pâturage, ...) : **35 à 85 kg MS/ha/j** la semaine dernière sur les parcelles suivies.

Pâturage : pic de pousse

En pâturage tournant, **le premier tour doit maintenant être terminé !** Si ce n'est pas le cas, et que dans une parcelle la hauteur d'herbe est > à 12 - 15 cm, la récolter dans les jours à venir permettrait de pouvoir la réintégrer « plus vite » dans le cycle de pâturage. Même avec un rendement de 1,5 - 2 T MS/ha, 1 ha débrayé pour la fauche éviterait le gaspillage et de couvrirait les besoins d'un UGB hiverné.

Remarque : après la fauche d'un méteil ou ray-grass annuel, un pâturage peut permettre de la souplesse sur les prés pâturés.

Fauches précoces

Dans l'ensemble, les stades de développement ne semblent pas encore « très avancés ». En revanche, l'absence de pluies et les températures plus chaudes de cette semaine risquent de les accélérer.

Même si les quantités ne semblent pas correspondre à celles attendues, **faucher** dès cette semaine permettra de **maximiser la qualité** des fourrages et d'envisager une **repousse** avant la période estivale (afin de rapidement réintégrer les parcelles dans le cycle de pâturage ou de réaliser une seconde coupe). Pour les récoltes précoces, faucher plus tard fera peu gagner en quantité mais par contre beaucoup perdre en qualité (cf graphique).