


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 22 mai 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1116	1004	8-juin	500 m alt. (calculé)	1026	871	16-juin
MONTLUCON (231 m)	1097	1014	9-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1011	866	17-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1100	1007	9-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	854	562	4-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1146	1008	6-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	814	625	4-juil.
<i>Gain moyen depuis le 15 mai</i>	126	97		<i>Gain moyen depuis le 15 mai</i>	125	81	

SUIVI EXPLOITATION (ST DIDIER EN DONJON)



- 6 ha débrayés du pâturage, fauchés en foin :
 - 2,5 ha le 11/05 (2,2 t MS/ha),
 - 3,5 ha le 16/05.
- 12,6 ha enrubannés précocement :
 - 5,1 ha multi-espèce le 30/04 (4 t MS/ha),
 - 4,5 ha RG+T le 09/05 (5,4 t MS/ha),
 - 3 ha multi-espèce le 19/05.


CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse très hétérogène sur le département (15 à 80 kg MS/ha/j)

Si moins de 25 jours d'avance :

- faire pâturer les parcelles fauchées depuis 15 - 20 jours,
- décharger le lot et recharger un autre lot où la situation est moins « tendue »,
- distribuer un fourrage sec en attendant les repousses après 1^{ères} coupes.

Il est maintenant trop tard pour débrayer une parcelle du pâturage pour la fauche (risque de pénaliser le pâturage dans les semaines à venir). Si les hauteurs d'herbe sont > à 15 - 20 cm : passer un lot d'animaux et faire pâturer moins bas sur les autres parcelles.

 Cette année, dans beaucoup de prairies (permanentes et temporaires), la proportion de trèfle est importante. Si + de 50 % : préférer des 2^{èmes} coupes pour ces parcelles (en particulier avec Trèfle Violet). Si pâturage diviser les parcelles, apporter un fourrage sec à disposition.

RAPPEL : Les animaux doivent disposer d'eau de qualité et de sel à volonté !

Fauches

Selon les secteurs, les conditions météo peuvent permettre de tenter des récoltes en foin dans les jours qui viennent. A cette période, le séchage est plus compliqué car les foin sont encore verts, pas mûrs sur pieds et l'humidité bien présente les matins : certaines préconisations sont à prendre en compte pour les réussir (cf encadré ci-contre).

FOINS : LES CLÉS DU SÉCHAGE ET LA CONSERVATION

Objectif = viser un taux de MS de **85 - 90 %**

- **75 % MS** = foin paraissant sec sauf sous les andains,
- **85 % MS** = foin craquant.

- ✓ **Étaler au maximum le fourrage**
 - faucheuse conditionneuse : faner directement après fauche pour étaler,
 - fauche à plat : le fourrage est directement étalé après fauche.

- ✓ **Faucher haut** = « hauteur de la main » (prairies : **6 - 7 cm minimum**, si légumineuses : 8 cm) : le fourrage ne sera pas plaqué au sol et l'air passera entre le sol et le fourrage → accélère le séchage.

- ✓ **Ne pas serrer les bottes** au pressage.

Remarques :
Attendre 7-10 j pour rentrer (si pas de pluie) et stocker les bottes à part.
Vérifier la température (< 45 °C).