


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 5 juin 2022

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1337	1223	8 juin	500 m alt. (calculé)	1239	1075	15 juin
MONTLUCON (231 m)	1319	1233	9 juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1220	1066	16 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1322	1226	9 juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1046	706	3 juillet
MONTBEUGNY (270 m)	1372	1227	6 juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	997	794	3 juillet
Gain moyen depuis le 29 mai	117	112		Gain moyen depuis le 29 mai	112	98	

### CROISSANCE DÉCADEAIRE DE L'HERBE



- Chute brutale de la pousse d'herbe.
- Perte de croissance avancée d'environ 1 mois par rapport à la moyenne 2008-2021.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Pâturage : une gestion « à flux tendu »

Avec 5 à 15 kg MS/ha/j la semaine dernière, la pousse d'herbe a été fortement impactée par les vents séchants et les chaleurs estivales (cf graphique ci-contre). Au-delà d'importants dégâts dans certaines régions du département, les averses orageuses de ce week-end devraient redonner un « coup de fouet » à l'herbe. En attendant, si possible, et en fonction des stocks de fourrages disponibles, donner de la souplesse aux parcelles pâturées au printemps :

- **En pâturage tournant** : ne pas ouvrir toutes les parcelles dès maintenant.
- **Si 20 à 25 jours d'avance** : continuer de faire tourner les lots en affourageant (de préférence avec du foin).
- **Si moins de 15 à 20 jours d'avance** : regrouper les lots dans une parcelle « parking » et affourager (foin). Cela permettra de mettre certains prés au repos pendant une dizaine de jours.
- Faire pâturer des lots sur des parcelles prévues initialement en 2<sup>ème</sup> coupe (si graminées à l'épiaison et repousses insuffisantes pour être fauchées).

⚠ Si beaucoup de légumineuses : laisser les fleurir, si possible découper les parcelles, distribuer un fourrage grossier à volonté (paille) et faire entrer les animaux la panse pleine.

#### 2<sup>èmes</sup> coupes de prairies riches en légumineuses

Pour optimiser la qualité des fourrages (même si les quantités ne sont pas au rendez-vous) : compter entre 6 - 7 semaines entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> coupe. Après, la qualité va chuter sans pour autant gagner en quantité.

Pour les récoltes de fin avril, la deuxième coupe serait donc à prévoir dans les 10 jours qui viennent.

Rappel : Ne pas faucher en dessous de 6 - 7 cm (« favorise » les repousses).

### ABREUVEMENT

- ✓ Consommation quotidienne :

Vache laitière	Vache allaitante	Brebis
70-100 L/j	50-80 L/j	10-15 L/j

⚠ Avec de fortes chaleurs, la quantité d'eau consommée peut dépasser les 100 L/j

- ✓ Idéalement, la distance jusqu'au point d'abreuvement ne doit pas excéder 200 m.

- ✓ Débit : prévoir au minimum 30 L/min.

Des aides départementales existent pour les projets de soutien à la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation :  
**Pour tous renseignements, contacter le 04 70 48 42 42**