


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 12 juin 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1461	1340	500 m alt. (calculé)	1356	1187	15 juin
MONTLUCON (231 m)	1444	1350	ÉCHASSIERES (650 m)	1333	1175	15 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1446	1344	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1153	791	3 juillet
MONTBEUGNY (270 m)	1496	1344	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	1097	888	3 juillet
<i>Gain moyen depuis le 5 juin</i>	125	119	<i>Gain moyen depuis le 5 juin</i>	111	109	

PLUVIOMÉTRIE : CUMUL DE JANVIER À MAI



Déficit par rapport à la moyenne 2011 - 2021 :
 → entre janvier et mai : **45 à 60 %**,
 → mai : **65 à 90 %**.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Les pluies orageuses de ce début juin, plus ou moins abondantes selon les secteurs du département (40 à 90 mm en 2 jours) ont permis de « ralentir » le coup de sec du mois de mai (*cf graphique*). Certains prés ont reverdi (laissés au repos, fauchés suffisamment haut, récoltés 1^{ère} quinzaine de mai, peu ou pas surpâturés,...). Sur les parcelles suivies, la pousse atteint 10 à 25 kg MS/ha/j.

Pâturage : une gestion qui reste à « flux tendu »

En attendant les possibilités d'agrandissement par l'intégration des prés de fauche pour décharger :

- continuer de faire tourner sans faire surpâturer : éviter de descendre en dessous de **5 cm**,
- si besoin, laisser certains prés « **au repos** » en serrant les lots sur une parcelle et en affourageant avec du foin (le temps de « favoriser » des repousses sur les autres prés).

Foins

Dans certaines situations (prés prévus en foin et stade avancé) :


- stade floraison passé, début égrainage : teneur en protéine va diminuer,
- herbe versée : foin vont blanchir, perte de valeurs alimentaires, difficulté à sécher,
- 2^{ème} coupe repousse dans la 1^{ère} : attention, cette herbe « jeune », plus humide, sera plus difficile à sécher => faucher haut pour favoriser la ventilation et vérifier la MS avant pressage.

Rappels : foin paraissant sec sauf sous les andains => 75 % MS,
foin craquant => 85 % MS.

DEUXIÈMES COUPES

➤ Optimiser le compromis quantité / qualité

- ✓ Si base de graminées (Ray-Grass, Dactyle, Fétuque) : récolter dès épiaison, avant floraison,
- ✓ Si riche en légumineuses : faucher 6 à 7 semaines après la 1^{ère} coupe (quelle que soit la date de la 1^{ère} coupe).



➤ Favoriser la pérennité

- ✓ Ne pas faucher trop bas : 6 – 7 cm,
- ✓ Légumineuses : laisser une coupe en fleur.