

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 19 juin 2022

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>1587</b>	1460	500 m alt. (calculé)	<b>1482</b>	1298	
MONTLUCON (231 m)	<b>1570</b>	1470	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>1459</b>	1285	
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>1572</b>	1464	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>1277</b>	874	2 juillet
MONTBEUGNY (270 m)	<b>1622</b>	1463	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>1220</b>	987	1 juillet
<i>Gain moyen depuis le 12 juin</i>	<b>126</b>	120	<i>Gain moyen depuis le 12 juin</i>	<b>125</b>	106	

### CONSEILS DE LA SEMAINE

Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont stoppé la dynamique de repousse espérée. Sur les parcelles suivies, la pousse atteint 5 à 30 kg MS/ha/j.

#### Bilan des stocks

Les récoltes de fourrages ont été très hétérogènes au niveau de la quantité. Si vos stocks sont limités, envisager de sécuriser les besoins de votre troupeau par des dérobées après moissons (cf tableau ci-contre). Pâturées ou récoltées, elles donneront de la souplesse dans la gestion du pâturage. Avant semis, un travail du sol superficiel est préconisé pour décompaction et destruction des chaumes.

*Remarque : l'implantation des dérobées reste aléatoire en fonction des conditions climatiques.*

#### Bilan fourrager

Dès à présent, faire le point sur les stocks disponibles, en sachant que les affouragements ont déjà débuté dans certaines zones du département.


➤ En fonction des périodes de vèlages, prévoir au minimum :

- Vèlages d'automne ≈ **2,2-2,4 t MS / UGB**,
- Vèlages de printemps ≈ **2 t MS / UGB**,
- Vèlages en plein air ≈ **2,4-2,5 t MS / UGB**.

**Ensilage : cuber le silo d'herbe** puis convertir les m<sup>3</sup> en t MS

- silo taube : 1 m<sup>3</sup> ≈ 180 kg MS
- silo couloir : 1 m<sup>3</sup> ≈ 200 kg MS

**Foin : MS 85% - Enrubannage : connaître la MS**, peser quelques bottes.



### GESTION DU TROUPEAU : RISQUES LIÉS AUX INTEMPÉRIES

Les orages violents et les températures importantes peuvent impacter votre cheptel :

- **Risques liés au stress durant les orages :**  
« vache qui coule »  
→ Réaliser des échographies (possible à partir de 35 jours), fouilles,  
→ Réformer et éviter les périodes improductives.
- **Risques parasitismes** (herbe rase + pluie) :  
→ Demander conseil à votre vétérinaire.
- **Abreuvement et forte chaleur** (cf IP n°17).

### LES DÉROBÉES

Espèces	Dose semis (kg/ha)	Profondeur semis (cm)	Coût semence /ha (€)
Sorgho multi coupe	25	2	55 / 80
Sorgho monocoupe	200 000 grains	2	105 / 120
Moha trèfle	25	0,5 à 1	50 / 65
Maïs très précoce	95 000 pieds	3-5	160 / 180
Colza fourrager	10	2	30 / 40
RGI + trèfle	30	0,5 à 1	85 / 110
Teff Grass	10	0 à 0,5	80 / 90