

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse hétérogène (10 à 35 kg MS/j/ha)

Diminuer le chargement pour atteindre progressivement 80-90 a/UGB. Selon la pousse, la complémentation des veaux mâles destinés à être vendus broutards risque d'augmenter. Etant donné les prix de l'aliment et des matières premières, maîtriser l'alimentation des veaux est nécessaire (cf encadré complémentation).

Fauche

Au vu des conditions météo annoncées, possibilités d'enrubannage de 2^{de} coupe si la qualité du fourrage à récolter est grande (prix des intrants élevés) : repousses riches en légumineuses, stade non dépassé (début épiaison pour graminées – début floraison pour légumineuses).

COMPLÉMENTATION DES VEAUX AU PRÉ

- **Faire des lots séparés de veaux mâles et femelles** pour ne **complémenter que les mâles**. Les **lots doivent être les plus homogènes possibles** (date de naissance et poids).

Selon les objectifs (période et poids de vente) et les contraintes d'organisation, distribuer soit à volonté, soit en rationné.

Remarque : Quand la gestion de l'herbe est maîtrisée, les croissances de veaux femelles non complémentés peuvent être d'1 kg/j. Si la pousse est très insuffisante l'été, les femelles pourront être complémentées en rationné avec le même aliment que les mâles (pas plus d'1 kg de concentré/j).

- **Compter 15 à 20 cm d'auge par veau (= 1 nourrisseur de 2 m pour 10 veaux).**

Choix de l'aliment

- ✓ 0,85 à 1 UFV/kg brut
- ✓ 100 à 120 g de PDI/UFV
- ✓ 16 à 18 % de MAT/kg brut
- ✓ 10 à 12 % de cellulose


Repères de consommation

Veiller à respecter l'équilibre herbe / aliment (**≈ 1 kg d'aliment pour 100 kg de poids vif**).

Soit par exemple 3-3,5 kg d'aliment pour un veau mâle de 300 kg (besoins ≈ 6,2 UF/j pour des performances de 1,6 kg/j (d'après les Tables INRA 2007).

Au-delà de 1,5 kg pour 100 kg de poids vif : l'aliment a pris toute la place, penser à sevrer les veaux.

PLUVIOMÉTRIE DE JUIN (mm)



La pluviométrie du mois de juin est 1,5 fois à 4 fois plus élevée que la moyenne des 10 dernières années.

QUI SUIS-JE ?

- Plante bisannuelle ou vivace
- Principalement dans les prairies sèches ou saines - peut traduire une conduite extensive
- Tiges rigides généralement refusées par les animaux (sauf en périodes très sèches)
- **Toxique en vert et en fourrage**
- ⚠ lors d'ingestions répétées
- Risque plus élevé en ensilage (pas de tri possible par les animaux)



Je suis le **SÉNEÇON DE JACOB (OU JACOBÉE)**
→ En pleine floraison actuellement, **détruire cette plante** si vous la voyez dans vos prairies !