

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pousse d'herbe : une année encore une fois « atypique »

Après un épisode de sec, sans précipitation, des températures excessivement élevées et des vents très séchants, la pousse d'herbe semblait compromise pour une bonne partie de la campagne. Depuis quelques jours, la situation a quelque peu changé puisque les pluies et les températures de ce mois de juin sont plutôt « favorables » à redynamiser la pousse pour quelques jours (cf graphique ci-dessous).

Les rendements en 1^{ères} coupes fauches précoces semblent dans la moyenne voire inférieurs (selon les types de sols et les pratiques : utilisation précédente, fertilisation,...). En revanche, ces conditions climatiques semblent avoir d'autant plus impactées les rendements en foin.

Pâturage : « reprise » de la pousse

Ce n'est pas une « pousse de printemps », mais pour la période les **quantités (20 à 45 kg MS/ha/j)** et la **qualité** sont, pour l'instant, plutôt au rendez-vous.

Compte tenu de ces croissances, même si on semble rentrer dans une période plus chaude, sans précipitation, pour optimiser le pâturage :

- continuer de faire tourner sur **minimum 4 à 5 parcelles** ou plus,
- intégrer les parcelles fauchées il y a **15 - 20 jours**,
- viser un chargement de **80 à 90 ares/UGB**,
- ne pas faire pâturer en dessous de **5 - 6 cm**,
- prioriser les parcelles les plus productives en quantité et qualité pour les lots de vaches suitées de veaux femelles non complémentés.


Fauche

Compte tenu des prévisions annoncées, la fenêtre météo devrait être favorable aux 2^{èmes} coupes qui n'ont pas été réalisées jusque là, ainsi qu'aux repousses après fauche.

- faucher haut : **7 - 8 cm** (favorise les repousses et le séchage),
- **brasser le moins possible** mais laisser sécher par aération et effet des températures.

Remarque : en fonction de votre situation, plutôt que d'intégrer dans le pâturage des parcelles précédemment fauchées, quelques ha pourront éventuellement être réservés à une 2^{ème} coupe.

CROISSANCE DÉCADEIRE DE L'HERBE



- début printemps : pic de pousse plus tardif,
- à partir de mi mai : chute très rapide,
- fin mai - début juin : croissance très faible,
- fin juin - début juillet : reprise de croissance.