

Sommes de températures au 19/02 Cumul à partir du 1 ^{er} janvier (° Cj)	Vichy	Echassières	Lurcy-Lévis	Montbeugny	Montluçon	Saint Nicolas
	260	203	256	265	272	135

POURQUOI RAISONNER EN SOMMES DE TEMPÉRATURES

Les différentes interventions sur prairies doivent être réalisées en fonction des stades de développement des principales graminées. Ceux-ci dépendent principalement de l'évolution de la température.

Les sommes de températures permettent donc d'anticiper l'évolution des stades de développement et ainsi les principales interventions fourragères à réaliser au cours de la campagne.

LES PRINCIPAUX REPÈRES A CONNAITRE

Somme de T°C	Intervention fourragère
Entre 200 °Cj base 1 ^{er} janvier et 200 °Cj base 1 ^{er} février	Apport d'azote sur fauches précoces
300 °Cj base 1 ^{er} février	Mise à l'herbe
450 °Cj base 1 ^{er} février	Fin des apports d'azote sur les prairies prévues en foin
500° Cj base 1 ^{er} février	Arrêt du déprimage
750° Cj base 1 ^{er} février	Début des fauches précoces
1100° Cj base 1 ^{er} février	Récolte des foins

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fertilisation des fauches précoces et méteils

Le stade repère des **200° Cj base 1^{er} janvier** est maintenant **atteint** sur la majorité du département (cf *tableau ci-dessus*).

Les 200° Cj base 1^{er} février = fin de période optimale pour les apports d'engrais (cf *IP n° 1*) devraient être atteints mi-mars.

Dès que des **pluies** sont **annoncées**, **prévoir** les apports **d'azote** sur les prés à ensiler ou enrubanner (doses : cf *IP n° 1*).

Prévoir l'organisation des surfaces en herbe

- **Répartition des surfaces fauches / pâtures = 50 - 50**

Prévoir de faucher **50 %** des surfaces totales en herbe en **1^{ère} coupe**.

Rappel : Objectif ≈ 2 t MS / UGB à hiverner (à ajuster en fonction du système de production).

- **Chargement au pâturage**

Viser **40 à 50 ares par UGB** selon le potentiel des parcelles.

- **Anticiper l'utilisation de l'herbe**

Optimiser la gestion des surfaces fauchées et pâturées (quantité et qualité) en l'adaptant au contexte annuel : s'anticipe par le **suivi des sommes de températures** (cf *encadré ci contre*).

Quelles stratégies si plus de 10-12 cm de hauteur d'herbe ?

→ envisager un pâturage rapide par un **petit lot** de génisses ou de vaches de réforme par exemple : **80-100 ares / UGB**.

*Attention à ne pas pénaliser les prairies implantées à l'automne par un **pâturage trop ras** ou l'arrachage des jeunes pousses.*

→ ou prévoir de faucher précocement pour faire une coupe de « nettoyage » et miser sur des repousses rapides.