

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 5 mars 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)


Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 200°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 200°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	161	187	11-mars	500 m alt. (calculé)	150	160	12-mars
MONTLUCON (231 m)	167	196	10-mars	ÉCHASSIERES (650 m)	147	152	14-mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	165	190	10-mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	106	109	26-mars
MONTBEUGNY (270 m)	168	186	10-mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	102	94	26-mars
Gain moyen depuis le 26 février	15	46		Gain moyen depuis le 26 février	7	32	

SUIVI POUSSE HERBE : C'EST REPARTI

Suivi hebdomadaire de parcelles, récoltées en fauche précoce et tardive, ainsi que pâturées (pâturage tournant)

4 exploitations suivies

BRESSOLES 280 m Bovins allaitants
LUSIGNY 240 m Bovins allaitants



DEUX CHAISES 450 m Bovins allaitants Ovins allaitants
ANELAROCHE 400 m Bovins allaitants

Cela permet

- Mesure de la hauteur d'herbe → calcul de croissance hebdomadaire
- Observation des stades physiologiques des plantes
- Observation de plantes bio-indicatrices

CONSEILS DE LA SEMAINE

Anticipation de la mise à l'herbe : organisation en pâturage tournant ?

L'optimisation par le pâturage tournant permet aux animaux d'avoir toujours de l'herbe jeune à disposition, d'éviter le gaspillage et de gagner en surface de fauche.

Quelques repères :

- ✓Chargement : 30-50 a/UGB
- ✓Chargement instantané : 8-10 a/UGB
- ✓Nombre de parcelles : 4 à 5 minimum
- ✓Temps de séjour : 3 à 5 j
- ✓Temps de repousse minimum : 21 j
- ✓Fin du 1^{er} tour : 650-700°Cj

Abreuvement	Clôtures : mobiles ou fixes ?
- 90-100 L/UGB/j - 200m max au point le plus éloigné du pré - bonnes qualités sanitaires	Mobile : souplesse d'adaptation Fixe : résistante (Δ bien réfléchir à la découpe des parcelles) <u>Rappel</u> : interdiction d'électrifier des barbelés

Afin de suivre la pousse de l'herbe, les mesures sont réalisées sur des parcelles en pâturage tournant (cf encadré ci-contre).

Fertilisation fauches précoces et méteils

Les 200°C jour base 1^{er} février devraient être atteints cette fin de semaine (cf tableau ci-dessus) : fin de la période optimale des apports. Ils doivent être finalisés afin d'éviter le risque de gaspillage. Profiter du créneau avant les pluies annoncées cette fin de semaine.

Info : La période d'interdiction de taille et de coupe des arbres et haies s'étend du 16 mars au 15 août.