

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 12 mars 2023

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 300°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	214	242	22-mars	500 m alt. (calculé)	198	208	25-mars
MONTLUCON (231 m)	225	252	21-mars	ÉCHASSIERES (650 m)	189	198	27-mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	220	243	21-mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	140	143	9-avr.
MONTBEUGNY (270 m)	221	241	21-mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	128	122	10-avr.
Gain moyen depuis le 5 mars	55	55		Gain moyen depuis le 5 mars	39	41	

### MIXITÉ AU PÂTURAGE

Bovins, ovins ou équins ne broutent pas de la même manière, et ont des préférences différentes. Contrairement aux bovins et aux ovins, les équins ont une double rangée d'incisives, ils exploitent des couverts ras.

#### Avantages

#### ➤ Zones de refus et préférences différentes

Les zones et/ou espèces délaissées par les uns font le bonheur des autres !

#### ➤ Dilution du parasitisme gastro intestinal

Souvent, les parasites sont spécifiques à chaque espèce. Le pâturage mixte « brise » les cycles d'infestation et réduit les contaminations.

#### Aménagements spécifiques

Clôtures et points d'eau doivent correspondre aux différentes espèces (hauteur d'abreuvoirs, électrification, grillage...).

#### En pratique

→ En alternance : les espèces se succèdent dans différentes pâtures aménagées en conséquence.

→ En simultané : mixer les espèces au sein d'une même parcelle (30 % d'équins - 70% de bovins).

Cheval	UGB
Cheval trait adulte	1
Poulain trait	0,75
Cheval selle adulte	0,65-0,8
Poulain selle	0,5-0,6
Poney	0,5

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Anticipation de la mise à l'herbe : déprimage, pâturage mixte ?

- **Déprimage ?** Il peut permettre de gagner en qualité de fourrages, mais aussi faire sortir certaines catégories plus tôt (avant les 300°C 1<sup>er</sup> fév qui devraient être atteints d'ici le 25 mars en plaine).

#### Si stocks de reports (hors transition et affouragement estival prévus) :

- < 10 % → éviter le déprimage qui risquerait de diminuer les rendements,
- > 10 % → possibilité de déprimer des parcelles de foin (max 1/3 des surfaces).

Prévoir un ou des lot(s) pour ces surfaces de fauches (chargement 70-80 a/UGB) pendant 7 à 10 j max.

#### ▪ Pâturage mixte ?

Prévoir les rotations, les alternances ou les lots mixtes d'animaux (cf encadré).

#### Fertilisation fauches précoces et méteils

Les 200°C jour base 1<sup>er</sup> février sont atteints et je n'ai pas fertilisé ?

- Fertiliser avant une prochaine pluie si annoncée dans les 7 à 10 jours à venir au risque d'une moins bonne valorisation de l'azote,
- Faire un choix sur certaines parcelles à fertiliser (1/2 de la surface? parcelles plus « tardives »? ...),
- Préserver une partie des quantités d'azote pour un apport après 1<sup>ère</sup> coupe et une valorisation sur 2<sup>nde</sup> coupe,
- Faire l'impasse.