

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 19 mars 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 300°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	291	297	9 avril	500 m alt. (calculé)	271	257	21 mars
MONTLUCON (231 m)	309	309	7 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	260	245	24 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	300	299	8 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	199	179	6 avril
MONTBEUGNY (270 m)	299	298	8 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	179	155	7 avril
Gain moyen depuis le 12 mars	80	56		Gain moyen depuis le 12 mars	65	43	

MISE À L'HERBE : RECOMMANDATIONS

- Si possible (parcelles proches des bâtiments) sortie en journée - rentrée la nuit pour une transition progressive.
- Mettre à l'herbe la **panse pleine**.
- Laisser un **fouillage sec** à disposition (foin ou paille) pendant 10 - 20 jours.
- **Eau** et **sel** à disposition.

SEMIS ET SURSEMIS DE PRINTEMPS : PRÉCONISATIONS

	SEMIS	SURSEMIS
Période	15 - 20 mars → 10 - 15 avril	
Particularités	Uniquement sous couvert de céréales	Nécessité de trous de végétation + couvert ras → Alternative « pansement »
Doses	Orge ou avoine de printemps (60 - 80 kg/ha) + prairie (25 - 30 kg/ha)	Espèces agressives : RGI ou RGH (25 - 30 kg/ha)
Conduite	Passage de herse (terre fine)	
	Semis de surface : 0,5 à 1 cm Semoir centrifuge ou à céréales classique socs relevés	
	Rouler avant et après semis	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

Les **300 °C base 1^{er} février** (= début de la mise à l'herbe des bovins) sont atteints en plaine et devraient l'être d'ici fin de semaine « en altitude » (cf *tableau ci-dessus*).

Même si la croissance de l'herbe est encore « timide », la météo à venir semble laisser une fenêtre suffisante pour le lâcher et être « favorable » à la pousse. Si les conditions le permettent (météo, portance des sols, organisation, ...) et en fonction de l'herbe disponible, **commencer la mise à l'herbe** et le 1^{er} tour de pâturage dès les 300 °C favorisera des repousses feuillues pour le printemps.

➤ Hauteur d'herbe pour la mise au pré ?

Privilégier en 1^{er} les prés avec plus de 7 cm d'herbe et les prairies permanentes ou à flore « variée ».

Si hauteurs d'herbe < 6 cm : distribuer un fourrage sec en complément.

Ne pas faire surpâturer : pas en dessous de 5 cm herbomètre = « herbe au bas du talon de la botte ».

➤ Qui ?

Commencer par les laitones, les génisses et les réformes. Ne pas sortir tout le lot (chargement de 70 – 85 ares/UGB) puis charger progressivement jusqu'à fin mars – début avril.

Entretien et renouvellement des prairies

Des **semis de printemps** (résultats corrects) peuvent être prévus et si certaines prairies (ou zones) sont très dégradées, des **sursemis** (résultats aléatoires) peuvent être envisagés (cf *encadré ci contre*).