

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 26 mars 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	366	361	8-avr.	500 m alt. (calculé)	341	311	12-avr.
MONTLUCON (231 m)	387	370	6-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	325	299	14-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	378	360	7-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	256	219	30-avr.
MONTBEUGNY (270 m)	378	363	7-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	229	193	3-mai
Gain moyen depuis le 19 mars	70	55		Gain moyen depuis le 19 mars	57	43	

DÉPRIMAGE OU ÉTÊTAGE ?

Faire passer un lot d'animaux avant fauche, oui, mais tout dépend ce que l'on recherche ?

➤ De la qualité sans pénaliser les quantités ?

Ne pas faire consommer l'épi dans la gaine = sortir les animaux avant le stade « épi 5 cm » (= 500°Cj base 1^{er} février).

→ c'est le **DEPRIMAGE**.


➤ Privilégier la qualité au dépend de la quantité ?

L'épi est consommé dans la gaine : les repousses sont « feuillues », de qualité mais les rendements diminuent.

→ c'est l'**ÉTÊTAGE**.

Remarque : au pâturage, on cherche à faire consommer l'épi dans la gaine pour éviter les refus (montée à épis) et avoir des repousses au maximum feuillues.

Pratique de l'étêtage



Source : Guide du pâturage, Programme Structurel Herbe et Fourrages en Limousin, 2013

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

Continuer la mise à l'herbe progressive pour débiter le 1^{er} tour de pâturage dès maintenant.

Les hauteurs d'herbe mesurées sur les parcelles suivies prévues au pâturage sont **encore faibles**, en moyenne **entre 4 et 6,5 cm** sur des parcelles non pâturées.

Hauteur recommandée au lâcher comprise entre 6 et 8 cm.

Si la quantité d'herbe est < 5 cm :

- **sortir les animaux** en ajustant le chargement (60 – 70 ares/UGB) et **affourager**,
- **retarder** la mise à l'herbe de quelques jours.

Le **déprimage** de certaines parcelles peut permettre de gagner des surfaces à pâturer. Attention toutefois de ne pas confondre déprimage et étêtage, au risque de pénaliser les rendements. (cf encadré)

⚠ Rappel : Une transition alimentaire (fourrage sec, ...) est nécessaire lors de la mise à l'herbe (voir IP n° 7).

Fertilisation des parcelles en foin

Repère : **350 - 450° Cj** base 1^{er} février = apport d'azote sur les parcelles de foin (non déprimées).

Les apports d'engrais (30 u N/ha et 50 u N/ha max) peuvent être réalisés sur les prairies destinées à être fauchées en foin dès cette semaine et ce jusqu'aux **450-500° Cj** soit dans une dizaine de jours.