

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 30 avril 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	724	721	13-mai	500 m alt. (calculé)	665	644	19-mai
MONTLUCON (231 m)	753	730	11-mai	ÉCHASSIERES (650 m)	631	620	23-mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	746	722	11-mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	515	494	7-juin
MONTBEUGNY (270 m)	746	729	11-mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	454	436	11-juin
<i>Gain moyen depuis le 23 avril</i>	98	79		<i>Gain moyen depuis le 23 avril</i>	83	64	

STADE « OPTIMUM » DE RÉCOLTE EN FAUCHE PRÉCOCE




Stade début épiaison

Stade début bourgeonnement

- Stade optimum de récolte des graminées = **Début épiaison – épiaison** (l'extrémité de l'inflorescence sort de la gaine).
- Stade optimum de récolte des légumineuses = **Début bourgeonnement - bourgeonnement** (on sent les bourgeons sous les doigts).

PLUVIOMÉTRIE D'AVRIL (mm)



Le cumul mensuel d'avril est proche de la moyenne 2011-2022 mais reste très hétérogène dans le département (25 mm à 160 mm).

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : une dynamique de pousse « forte »

Les conditions du mois d'avril (*cf encadré ci-contre*) ont donné un coup de fouet à la pousse de l'herbe qui reste hétérogène : **40 à 70 kg MS/ha/j** sur les parcelles suivies.

- Si moins de 15 - 20 jours d'avance ou hauteur d'herbe < 6 cm sur toutes les parcelles : **diminuer le chargement** (50 - 60 a/UGB) et/ou affourager en rassemblant le lot sur un paddock.
- Si plus de 20 jours d'avance et/ou hauteur d'herbe > 10 – 12 cm : si la portance le permet, **augmenter le chargement** (jusqu' à 35 - 45 a/UGB).
- Si plus de 25 jours d'avance ou hauteur herbe > 15 cm : si possible, **retirer une parcelle du pâturage** pour la récolter en enrubannage ou ensilage dès que la météo le permet.

Rappel : dans tous les cas, ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm, pour ne pas pénaliser la repousse.

Ensilages et Enrubannages : objectif 750 °Cj (cette fin de semaine en plaine)

Les prairies précoces, légumineuses, méteils évoluent vite : une fois le stade début épiaison - épiaison pour les graminées et bourgeonnement pour les légumineuses passé, la MAT chute rapidement (**-1,5 point de MAT/semaine**). Si la portance le permet et que 4 à 5 j de beau sont annoncés **faucher** dans les jours qui viennent.

Repères de MS :

- si les doigts s'humidifient sans goutte en tordant 1 poignée à la main : 35 % MS,
- si pas d'humidité sur les doigts : 45 % MS,
- si certaines feuilles cassantes : 65 % MS.