

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 07 mai 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 900°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	823	806	12 mai	500 m alt. (calculé)	759	722	18 mai
MONTLUCON (231 m)	849	814	10 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	727	694	21 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	845	808	10 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	597	560	6 juin
MONTBEUGNY (270 m)	847	815	10 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	533	494	8 juin
Gain moyen depuis le 30 avril	99	85		Gain moyen depuis le 30 avril	89	71	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Ensilages et enrubbages : c'est le moment

La semaine dernière, compte tenu des conditions météo favorables, une partie des ensilages et enrubbages a été réalisée, ce qui laisse envisager des récoltes de qualité.

Avec un gain moyen de 90-100 °C par semaine (cf *tableau*), les stades avancent très rapidement : attendre plus fera gagner un peu en quantité mais par contre perdre beaucoup en qualité.

Même si certaines prairies ont été retardées par le gel, le stade début épiaison - épiaison (compromis entre quantité et qualité) est maintenant globalement atteint : faucher dès qu'une fenêtre météo le permet.

Pâturage : La pousse de l'herbe atteint 45 à 70 kg MS/j/ha

Le pic de la pousse de l'herbe est atteint (cf *graph*). En cette période, il est nécessaire d'avoir **25 j d'avance**.

➤ **Si moins de 25 jours** : continuer de faire tourner car même si la quantité n'est pas au rendez-vous, les stades des graminées avancent rapidement avec les températures.

Ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm.


Mettre le lot quelques jours, derrière une fauche précoce de prairie ou méteil, afin de consommer les bords et résidus non ramassés peut donner un peu de souplesse.

➤ **Si environ 25 jours** : continuer avec la même organisation.

➤ **Si plus de 25 jours** : Si possible, faucher une parcelle prévue au pâturage (si > 15 cm d'herbe).

Pour rappel, 1 ha de fauche (à 2-3 t MS/ha) permet d'hiverner 1 UGB, ce qui n'est pas négligeable.

RÉCOLTE DES LÉGUMINEUSES : STADE « OPTIMUM »



Début Bourgeonnement

Début Floraison



20 % en boutons




50 % avec un liseré violet

1^{ère} coupe :

Stade optimal de récolte = dans les **2 semaines** après apparition des **1^{ers} bourgeons**.

CROISSANCE DÉCADAIRE DE L'HERBE (kg MS/ha/j)



Le **pic de pousse** semble atteint.

Retard de 7 à 10 jours par rapport à la moyenne 2008 - 2022 : moins de jours d'avance.